

January 1978

Adiciones a la Avifauna Colombiana, VII VIREONIDAE – FRINGILLIDAE

Hno. Nicéforo María
Universidad de La Salle, revista_uls@lasalle.edu.co

Antonio Olivares O.
revista_uls@lasalle.edu.co

Follow this and additional works at: <https://ciencia.lasalle.edu.co/ruls>

Citación recomendada

María, H., y A.Olivares O. (1978). Adiciones a la Avifauna Colombiana, VII VIREONIDAE – FRINGILLIDAE. Revista de la Universidad de La Salle, (4), 69-113.

This Artículo de Revista is brought to you for free and open access by the Revistas de divulgación at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Revista de la Universidad de La Salle by an authorized editor of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Adiciones a la Avifauna Colombiana, VII

VIREONIDAE — FRINGILLIDAE

Por *Hermano Nicéforo María, f. s. c.*
Director del Museo del Instituto
de La Salle, Bogotá

y
† *Antonio Olivares, o. f. m.*
Profesor del Instituto de Ciencias Naturales,
Universidad Nacional, Bogotá

Con esta parte VII, terminamos la serie "Adiciones a la Avifauna Colombiana", de la cual las seis primeras aparecieron así:

La primera *Tinamidae - Falconidae* en el Boletín del Instituto La Salle, N° 204, Bogotá, noviembre 15 de 1964.

La segunda, *Cracidae - Rynchopidae*, en el Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo 26, N° 109, Caracas Venezuela, septiembre de 1965.

En el mismo Boletín venezolano, N° 110 se encuentra la tercera, *Columbidae - Caprimulgidae*.

La cuarta, *Apodidae - Picidae*, en el Hornero, revista de la Asociación Ornitológica del Plata, volumen 10, N° 4, diciembre de 1967.

La quinta, *Dendrocolaptidae - Cotingidae*, en el mismo Boletín del Instituto de La Salle, N° 208, 1968.

La sexta, en tres entregas: Entrega (A) *Tyrannidae* - Entrega (B) *Tyrannidae* (continuación) - *Troglodytidae*.

Entrega (C) *Troglodytidae* (continuación - *Bombycillidae*. Estas entregas fueron de Lozania, publicación del Instituto de Ciencias, Museo de Historia Natural, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia, Nº 19, abril de 1975, números 20 y 21, en febrero y octubre, respectivamente de 1976.

La séptima y última parte, *Vireonidae* - *Fringillidae*, en la Revista de la Universidad Social Católica de La Salle, volumen 1, Nº 4, Bogotá, diciembre de 1978.

* * *

Presentamos los registros ornitológicos posteriores a los recopilados por de Schauensee en "Birds of the Republic of Colombia" (1948-1952) basándonos en el material del Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional, Bogotá (ICN) y del Museo del Instituto de La Salle, Bogotá (M. La S).

Las localidades de captura correspondientes a las colecciones de estas dos instituciones no llevan siglas; pero las de la literatura reciente que nos fue posible consultar, aparecen con el número que se expresa en la bibliografía, al final de cada entrega. Nos referimos siempre al material coleccionado omitiendo los registros visuales. De las localidades que no han sido citadas en la literatura se da una corta descripción en la primera parte.

VIREONIDAE

Cyclarhis gujanensis canticus Bangs
Santander: Pescadero, El Centro (4).

Cundinamarca: Guaduas, Sasaima, Fusagasugá, Santandercito, La Vega (31d), Rafael Reyes, La Aguadita, Quetame (Monte Redondo).

Tolima: Carmen de Apicalá, Melgar.

Cyclarhis gujanensis parvus Chapman

Norte de Santander: Pamplona, El Diamante.

Boyacá: Río Negro (13), La Colorada (río Casanare) (13).

Meta: Cubarral, Guamal.

Cyclarhis nigrirostris nigrirostris Lafresnaye

Boyacá: Alto de Onzaga (7).

Cundinamarca: Albán (31d), Tequendama (31d), La Aguadita (31d).

Este género se adscribía a *Cyclarhidae*. Cf. de Schauensee (17a).

Smaragdolanus pulchellus eximius (Baird)

Santander: El Tambor (Hacienda Santa Ana) (13).

Boyacá: Fátima (2), río Cobugón, La Argentina (2).

De Schauensee (17a) optaba por la especie *eximius*.

Smaragdolanus leucotis mikettae (Hartert)

Nariño: La Guayacana (34, 14).

Este género se encontraba en Vi-reolaniidae. Cf. de Schauensee (17a).

Vireo flavifrons (Vieillot)

Guajira: Serranía de Macuira (Nazaret) (21a).

Bolívar: San Carlos (20a).

Chocó: río Tanela (20a).

Valle: San Antonio (24a).

Vaupés: Mitú (30).

Vireo olivaceus olivaceus (Linneo)

Bolívar: Magangué, San Isidro (20a), Yatí (20a).

Norte de Santander, Cúcuta.

Antioquia: Amagá, entre Zaragoza y Anorí.

Santander: San Gil.

Boyacá: Miraflores (29), Soatá (7).

Cundinamarca: Zipaquirá (31d), Sopó (31d), Usaquén, Bosa (31d), Páramo de Guasca (31d),

Fusagasugá (31d), Puerto Salgar, El Hospicio, La Vega, Sylvania (31d), Une (31d), Aguadita (31d), Laguna de Pedropalo.

Meta: Los Micos (3), río Guayapa (3), Boca del Zanza (La Macarena), Cubarral, Guamal, Puerto Gaitán.

Vaupés: Mitú.

Caquetá: Florencia.

El material del Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Caquetá es de septiembre a primeros días de abril.

Vireo Olivaceus chivi (Vieillot)

Vaupés: Mitú (32).

Vireo olivaceus flavoviridis (Cassin)

Bolívar: Arroyo Camaroncito (20a), San Isidro (20a).

Antioquia: Medellín.

Tolima: Melgar.

Huila: Villavieja (22).

Vaupés: Mitú (32, 30).

Nariño: río San Miguel (16).

Caquetá: río Orteguzaza.

Los registros de Tolima y Caquetá son de los primeros días de octubre.

Vireo gilvus leucophrys (Lafresnaye)

Boyacá: Arcabuco.

Cundinamarca: La Vega (31d),

Santandercito (31d), La Aguadita (31d), Aguabonita (31d), Laguna de Pedropalo.

Hylophilus semibrunneus Lafresnaye

Cundinamarca: El Colegio (31d),

Sasaima (31d), Laguna de Pedropalo.

Hylophilus hypoxanthus hypoxanthus Pelzeln

Vaupés: Selvas del Cubiyú (31).

Hylophilus flavipes flavipes

Lafresnaye

Cundinamarca: Pandi, Sasaima,

El Colegio, Santandercito (31d),

La Vega (31d), El Peñón, Guaduas (31d), Laguna de Pedropalo,

Arbeláez, Fusagasugá (31d),

Rafael Reyes.

Tolima: Gualanday, Melgar, Iba-

gué.

Hylophilus flavipes galbanus

Wetmore y Phelps

Guajira: Carriapía (17), Maicao (17).

Magdalena: base oriental de la Sierra de Santa Marta (La Cueva) (17), valle del río Ranchería (El Conejo, Riohacha) (17).

Norte de Santander: Cúcuta, Villa Feliza (17).

Meta: Cubarral, Guamal, río Ariari, Casa del Mico (Sierra de La Macarena Norte).

De Schauensee (17) dice que la subespecie nominada no ocurre en el oriente de los Andes Orientales, como se creía anteriormente.

Hylophilus ochraceiceps ferrugineifrons Sclater

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyaco (16).

PARULIDAE

Mniotilta varia (Linneo)

Norte de Santander: río Pamplonita (Cúcuta), Gramalote, Lourdes, El Diamante, Santa Librada, Sarare.

Santander: Socorro.

Boyacá: Soatá (7).

Cundinamarca: Arbeláez (31d), La Aguadita (31d), Fusagasugá (31d).

Meta: Villavicencio.

Todo este material fue coleccionado de septiembre a fines de febrero.

Protonotaria citrea (Boddaert)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Magdalena: Santa Marta.

Bolívar: Magangué, Yatí (20a).

Norte de Santander: Cúcuta.

Chocó: Sautatá (19), Acandí (19).

Cundinamarca: Puerto Salgar.

Huila: Villavieja (22).

El material de Magdalena es de enero 2; el de Norte de Santander de septiembre 5.

Vermivora chrysoptera (Linneo)

Norte de Santander: Sarare, Santa Librada.

Boyacá: Tunja.

Cundinamarca: La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Fusagasugá (31d).

Nariño: Ricaurte (35).

El material de Norte de Santander es de febrero 21; el de Boyacá de abril 3.

Vermivora peregrina (Wilson)

Santander: San Gil, La Selva, Las Peñitas.

Boyacá: Soatá (7), Miraflores (29).

Cundinamarca: Bogotá (31d), Une (31d), La Vega (31d), Chía (31d), Laguna de Pedropalo.

Meta: Villavicencio.

El presente material es de diciembre a primeros días de marzo.

Parula pitiayumi elegans (Todd)

Norte de Santander: Santa Librada, Sarare.

Boyacá: Soatá (7).

Quindío: Calarcá.

Cundinamarca: Albán, Machetá, Une (31d), Cáqueza (31d), El Peñón, Laguna de Pedropalo.

Parula pitiayumi pacifica Berlepsch
y Taczanowski
Cauca: Guapi (26).

Dendroica petechia aestiva (Gmelin)
Guajira: Serranía de Macuira
(Internado Guajira) (21a).
Norte de Santander: Cúcuta.
Santander: El Centro (4).
Boyacá: Soatá (7).
Caldas: Chinchiná (5).
Cundinamarca: Arbeláez, La Me-
sa, Sasaima, Chía (31d), Girar-
dot (31d), Puerto Salgar (31d),
Madrid.
Meta: Cumaral.
Tolima: Melgar.
Huila: Garzón.
Cauca: Guapi (26).
Caquetá: Florencia.
Los registros de Norte de Santan-
der, Cundinamarca y Caquetá, son
de noviembre a febrero.

Dendroica petechia chrysendeta
Wetmore
Guajira: Nazaret (21a).

Dendroica petechia peruviana
Sundevall
Cauca: Guapi (26).

Dendroica petechia omnicola
Batchelder
Huila: Villavieja (23).

Dendroica magnolia (Wilson)
Boyacá: Soatá (7, 17).

Dendroica caerulescens (Gmelin)
Guajira: Serranía de Macuira (Ti-
tujura) (21a).

Dendroica cerulea (Wilson)
Norte de Santander: La Donjuana.
Boyacá: Miraflores (29).
Meta: Macarena.
El registro de Norte de Santander
es de diciembre 16; el del Meta
de marzo 2.

Dendroica fusca (Müller)
Norte de Santander: La Selva.
Santander: Mesa de Los Santos.
Boyacá: Alto de Onzaga (7), Mi-
raflores (29).
Caldas: Salento, Salamina.
Cundinamarca: Tequendama
(31d), Chapinero (31d), Mos-
quera (31d), Bojacá (31d), Usa-
quén (31d), Laguna de Pedropa-
lo (31d), La Vega (31d), Gua-
yabetal (31d).
Meta: Pico Renjifo (3), Villavi-
cencio, Restrepo.
Los registros de Norte de Santan-
der, Caldas y Cundinamarca son
de septiembre, octubre, noviembre
y abril.

Dendroica pensylvanica (Linneo)
Antioquia: entre Zaragoza y Anorí
Santander: Cordillera de La Paz,
hacienda Montebello (8, 17).
Tolima: Mariquita (8, 17).

Dendroica castanea (Wilson)
Bolívar: Lázaro (20a).
Norte de Santander: La Donjuana.
Antioquia: Puerto Berrío, río Gua-
dualito (19), Turbo, entre Zara-
goza y Anorí.
Chocó: Sautatá (19), Unguía

(19), río Tanela (19), Acandí (19).

Santander: El Centro (4).

Meta: Llanos Orientales, Guamal. El registro de Norte de Santander es de diciembre 14; el de Antioquia (Puerto Berrío) de noviembre 2.

Dendroica striata (Forster)

Guajira: Serranía de Macuira (Kaitpanohu) (21a).

Magdalena: Santa Marta.

Antioquia: Medellín.

Santander: San Gil.

Boyacá: Soatá (7), Miraflores.

Arauca: río Cobaría (La Ceiba) (2).

Vichada: Santa Teresita (31c).

Cundinamarca: Chapinero (31d), Sabana de Bogotá (31d), Fusagasugá.

Meta: Acacias, Bocas del Zanza, Los Micos, río Guapaya (3), Guamal, Cubarral, Caño Negro, Tanané.

Los registros de Magdalena, Antioquia, Santander y Cundinamarca son de octubre, enero y abril.

Dendroica townsendi (Townsend)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Seiurus aurocapillus aurocapillus (Linneo)

Magdalena: Santa Marta.

Coleccionado en enero.

Seiurus noveboracensis limnaeus

McCabe y Miller

Guajira: Serranía de Macuira (In-

ternado Guajira) (21a).

Ant.: entre Zaragoza y Anorí.

Boyacá: Soatá (7, 17), Miraflores (29).

Cundinamarca: Sasaima (31d), Santandercito (31d), Sabana de Bogotá (31d), Cáqueza (31d), Une (31d), Fusagasugá (31d).

Meta: río Guayabero (28).

Cauca: Guapi (26).

Marinkelli (21a) no reconoce subespecies. Con reserva se adscribe aquí a *limnaeus*, por haber ya varios registros de esta subespecie en Colombia.

Seiurus noveboracensis subsp

Magdalena: Santa Marta.

Bolívar: Arroyo Playón (20a),

San Carlos (20a), Lázaro (20a).

Antioquia: río Gaudalito (19),

Turbo.

Santander: San Gil, El Centro (4), Marengo.

Boyacá: Tunja.

Cundinamarca: Puerto Salgar, Rafael Reyes.

Meta: Villavicencio, Los Micos (3).

Caquetá: Villa María (río Ortegua).

Material de Boyacá, Cundinamarca y Caquetá es de octubre a marzo.

Oporornis formosus (Wilson)

Santander: El Centro (4).

Oporornis philadelphia (Wilson)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Magdalena: Santa Marta.

Bolívar: Tenche (20a), San Cristóbal (20a).

Antioquia: entre Zaragoza y Anorí
Norte de Santander: La Selva, La Donjuana, Cúcuta.

Chocó: Sautatá (19).

Santander: El Centro (4), San Vicente, Las Peñitas, El Guadual.

Boyacá: Soatá (7), Miraflores (29).

Cundinamarca: Arbeláez, Sasaima, Fusagasugá (31d), La Aguadita (31d), Puerto Salgar (31d), San Antonio de Tena, Laguna de Pedropalo, El Peñón, Rafael Reyes.

Valle: San Antonio (24a).

Meta: Guamal.

Caquetá: Florencia.

El material no publicado anteriormente fue coleccionado de octubre a abril.

Oporornis tolmiei (Townsend)

Boyacá: Soatá (7).

Geothlypis trichas minnesotica

Oberholser

Guajira: Serranía de Macuira (Mukurraruhu) (21a).

Geothlypis trichas brachidactylus

(Swainson)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Geothlypis aequinoctialis aequinoctialis (Gmelin)

Boyacá: Miraflores.

Cundinamarca: Puerto Salgar.

Meta: Plaza Bonita, Los Micos

(3), río Guayabero (Macarena Sur).

Geothlypis semiflava bairdi Nutting
Cauca: Guapi (26).

Wilsonia canadensis (Linneo)

Antioquia: entre Zaragoza y Anorí
Boyacá: Miraflores (29), Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Cundinamarca: Bojacá (31d), Chapinero (31d), Sasaima (31d), Arbeláez (31d), El Hospicio (31d), El Salto (31d), Laguna de Pedropalo, La Aguadita (31d), La Vega (31d), Quetame (Guayabetal) (31d).

Meta: Villavicencio, Pico Renjifo (3).

Caquetá: Florencia.

El material no registrado anteriormente en la literatura es de agosto, septiembre, diciembre y mayo.

Setophaga ruticilla ruticilla

(Linneo)

Norte de Santander: Cúcuta.

Boyacá: Tunja.

Cundinamarca: Bogotá (31d), Chapinero (31d), Sasaima (31d), Une (31d).

Meta: río Ocoa, Los Micos, Pico Renjifo (3), río Guayabero (28).

El material no registrado anteriormente en la literatura es de septiembre, octubre y febrero.

Setophaga ruticilla tricolora

(Müller)

Boyacá: Soatá (7), Miraflores (29).

Setophaga ruticilla subsp

Bolívar: Cansona (20a), Lázaro (20a).

Myioborus miniatus ballux

Wetmore y Phelps

Norte de Santander: Toledo, La Donjuana, Pamplona, El Diamante.

Antioquia: Jericó, San Vicente.

Boyacá: Alto de Onzaga (7).

Cundinamarca: Tequendama (31d), Albán, La Vega (31d), Machetá (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Quetame.

Meta: Pico Renjifo (3).

Cauca: Buenavista.

Myioborus ornatus ornatus

(Boissonneau)

Norte de Santander: Mutiscua, Pamplona (24b).

Boyacá: Arcabuco, Alto de Onzaga (7).

Cundinamarca: La Mesa (31d), La Herrera (31d), Páramo de Guasca (31d), San Miguel (31d), Aguadita, Silvania.

Myioborus ornatus chrysops

(Salvin)

Caldas: Nevado del Ruiz.

Basileuterus nigrocristatus

(Lafresnaye)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Mutiscua.

Cundinamarca: Albán (31d),

Usaquén (31d), Sopó (31d), Gachancipá (31d), Fusagasugá (31d), Aguabonita (31d), Usme (31d), La Calera (31d), Guasca

(31d), San Miguel (31d), Subachoque (31d), Suba (31d).

Basileuterus luteoviridis luteoviridis

(Bonaparte)

Boyacá: Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Basileuterus signatus (signatus)

Berlepsch y Stolzmann

Cundinamarca: Páramo de Guasca (17, 10, 31d).

Borrero y Hernández (10), catalogaron este material como *Basileuterus xanthophrys* (Sclater) comb. nov.

Basileuterus tristriatus auricularis

Sharpe

Guajira: Serranía de Macuira (21a).

Norte de Santander: Pamplona.

Boyacá: Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Cundinamarca: Tequendama (31d).

Nariño: Altaquer.

Basileuterus culicivorus cabanisi

Berlepsch

Norte de Santander: Lourdes, El Diamante, La Donjuana, río Pamplonita (norte de Pamplona).

Basileuterus culicivorus austerus

Zimmer

Meta: Villavicencio.

Basileuterus culicivorus occultus

Zimmer

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Soatá (7).

Basileuterus rufifrons mesochrysus
Sclater

Bolívar: Cansona (20a).

Magdalena: Santa Marta.

Santander: San Vicente.

Cundinamarca: Sasaima (31d),

Girardot (31d), La Vega (31d),

La Mesa (31d), Santandercito

(31d), Fusagasugá (31d), Tocai-

ma (31d), Rafael Reyes.

Tolima: Melgar, Ibagué.

Por muchos años se mantuvo en la especie *delatirii*.*Basileuterus cinereicollis cinereicollis*
Sclater

Norte de Santander: La Donjuana.

Cundinamarca: La Vega (31d).

Basileuterus coronatus regulus
Todd

Antioquia: San Pedro.

Boyacá: El Caucho, Sisbaca, Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Límites Cundinamarca y Meta: Susumuco (vía Villavicencio).

Cundinamarca: Sasaima (31d),

Albán (31d), Aguabonita (31d),

Susumuco (31d), Laguna de Pedropalo.

Basileuterus rivularis semicervinus
Sclater

Cauca: Guapi (26).

Basileuterus rivularis motacilla
Miller

Antioquia: entre Zaragoza y

Anorí.

Santander: San Vicente (Monte

Bello) (12), San Vicente (La Curva) (12).

Cundinamarca: Santandercito (12), El Chocho (12), Tobia (31d), La Vega (31d), Sasaima (31d), Fusagasugá (31d).

Tolima: Gualanday, Espinal, Bquerón de Melgar (12), Ibagué.

Basileuterus rivularis fulvicauda
(Spix)

Meta: río Guapaya (3).

Caquetá: Aserrió, Selva entre los ríos Pescado y Caquetá.

COEREBIDAE

Coereba flaveola luteola (Cabanis)

Guajira: Mayapo, Uitpa (20).

Magdalena: Isla de Salamanca.

Bolívar: Arroyo Camaroncito (20a).

Norte de Santander: Tibú, Gramalote, Petrolea, El Diamante.

Arauca: río Cobaría (La Ceiba) (2), río Arauca (2).

Boyacá: Fátima (2), río Cobugón (El Porvenir) (2).

Coereba flaveola intermedia minima
Vaupés: Mitú (32).*Coereba flaveola minima*
(Bonaparte)

Vichada: Santa Teresita (31c).

Guainía: Obando (Puerto Inirida) (31c).

Coereba flaveola columbiana
(Cabanis)

Chocó: Acandí (19).

- Antioquia:** entre Zaragoza y Anorí.
Santander: El Centro (4), La Albania, Simacota.
Boyacá: Sutatenza, Miraflores.
Cundinamarca: Las Mesitas, Silvania, Arbeláez, Girardot (31d), La Mesa (31d), San Antonio de Tena, Anolaima (31d), Vianí (31b-31d), Manta (31d), Puerto Salgar (31d), Pacho, Laguna de Pedropalo, La Vega (31d), El Peñón, El Ocaso (31d).
Tolima: Carmen de Apicalá, Melgar.
Meta: Pachaquiario, Laguna de Tanané.
 El ejemplar de Sutatenza se aproxima a *luteola*.
 Sobre el material de Simacota, el Dr. Plutarco Cala está adelantando una publicación.
- Coereba flaveola intermedia***
 (Salvadori y Festa)
Cauca: Guapi (26).
- Conirostrum rufum*** Lafresnaye
Norte de Santander: Pamplona (24b), Mutiscua.
Boyacá: Motavita, Tunja.
Cundinamarca: Páramo de Guasca (31d), Sumapaz (31d), Gachancipá (31d), Chía (31d), Fosca (31d), Usaquén (31d), Tabio (31d), La Calera (31d), Cota (31d), La Picota (31d), Sabana de Bogotá (31d), La Cita (31d), Torca (31d), Zipaquirá (31d), Laguna del Chisacal (31d), Usme, La Caro, San Miguel.
- Conirostrum sitticolor sitticolor***
 Lafresnaye
Norte de Santander: Pamplona (24b).
Cundinamarca: Páramo de Guasca (31d), San Miguel (31d), Usaquén, Bogotá, Torca.
- Conirostrum albifrons albifrons***
 Lafresnaye
Boyacá: Alto de Onzaga (7).
Cundinamarca: Aguabonita (31d), Mosquera (31d).
- Conirostrum albifrons atrocyanum***
 Lafresnaye
Nariño: Cerro Pax (16).
- Conirostrum leucogenys leucogenys***
 (Lafresnaye)
Tolima: Carmen de Apicalá.
- Diglossa cyanea cyanea*** (Lafresnaye)
Antioquia: Yarumal, Caldas.
Norte de Santander: Pamplona (24b).
Boyacá: Ventaquemada, Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).
Cundinamarca: Aguabonita (31d), La Calera (31d), Páramo de Guasca (31d), San Miguel, Chipaque (31d), La Cita (31d), El Chicó, Siberia (31d), Sopó (31d), Albán (31d), Tequendama (31d), Fontibón (31d), Usaquén (31d), Sasaima (31d), Fusagasugá (31d), Usme.
Tolima: Herveo.
Cauca: Tijeras, San Marcos.
 El ejemplar de Ventaquemada (un macho adulto) aparece más oscuro al compararlo con material

de Cundinamarca (de la ladera occidental de los Andes Orientales).

Diglossa caerulescens saturata

(Todd)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Mutiscua.

Antioquia: Santuario.

Arauca: río Bojacá (2).

Boyacá: La Primavera, Arcabuco, Alto de Onzaga (7).

Cund.: La Calera, Páramo de Guasca (31d), Chocontá (31d), La Aguadita (31d), Tequendamá (31d), Usaquén (31d), Aguabonita (31d), Mosquera (31d), La Mesa (31d), El Chicó (31d), San Miguel (31d), Bojacá (31d), La Vega, Sabana de Bogotá (31d), Sopó (31d), Fugasasugá.

Diglossa carbonaria humeralis

(Fraser)

Santander: Peña Blanca.

Boyacá: Motavita, Ventaquemada, Lagunilla.

Cundinamarca: Páramo de Guasca (31d), San Miguel (31d), La Siberia (31d), Tabio (31d), La Cita (31d), Gachancipá (31d), Torca (31d), Bogotá (31d), Bojacá (31d), Suba (31d), Cruz Verde (31d), Usaquén (31d), Chapinero (31d), Chía, Ubaté (31d), Sopó (31d), La Calera (31d), La Caro.

Diglossa carbonaria brunneiventris

Lafresnaye

Antioquia: Yarumal.

Diglossa lafresnayeii lafresnayeii

(Boissoneau)

Norte de Santander: Toledo.

Boyacá: Páramo de Vijagual.

Cundinamarca: Páramo de Guasca (31d), Páramo de Palacio (31d), San Miguel (31d), Usaquén (31d), Bogotá.

Diglossa albilatera albilatera

Lafresnaye

Antioquia: San Vicente.

Boyacá: Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Cundinamarca: Sasaima (31d), Páramo de Guasca (31d), Represa del Sisga (31d), Aguabonita (31d), La Cita (31d), El Chicó (31d), Bogotá (31d), Laguna de Pedropalo.

Diglossa baritula d'orbigny

(Boissonneau)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Sarare (Santa Librada).

Antioquia: San Pedro (Llanos de Ovejas).

Cundinamarca: La Vega (31d), La Aguadita (31d), El Roble (31d), Chía (31d), Une (31d), Laguna de Pedropalo, Bogotá.

Cyanerpes caeruleus caeruleus

(Linneo)

Magdalena: Santa Marta.

Cyanerpes caeruleus microrhynchus

(Berlepsch)

Norte de Santander: La Javilla, Sarare (Santa Librada).

Antioquia: entre Zaragoza y Anorí.

- Boyacá: Muzo, Casanare, Fátima (2), río Cobugón (La Argentina) (2).
- Meta: río Guamal, La Macarena, Los Micos, río Guapaya y Pico Rengifo (3).
- Vaupés: Mitú (32).
- Nariño: río San Miguel (16).
- Cyanerpes cyaneus dispar* Zimmer
Norte de Santander: La Donjuana.
Vaupés: Sabanas del Cubiyú (31).
- Cyanerpes cyaneus pacificus*
Chapman
Cauca: Guapi (26).
- Cyanerpes cyaneus chocoanus*
Hellmayr
Valle: río Anchicayá.
- Dacnis lineata lineata* (Gmelin)
Meta: río Guamal.
Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).
Caquetá: Tres Esquinas.
- Dacnis lineata egregia* Sclater
Antioquia: entre Zaragoza y Anorí.
Santander: El Centro (4).
Tolima: Mariquita, Carmen de Apicalá.
- Dacnis cayana cayana* (Linneo)
Norte de Santander: La Javilla, Tibú, Petrolea.
Meta: Villavicencio, Chafurray, Los Micos y río Guapaya (3), río Guayabero (28), Acacias.
Guainía: río Inírida (5), Obando (Puerto Inírida) (31c).
Vaupés: Mitú (32), Sabanas del Cubiyú.
- Dacnis cayana napaea* Bangs
Antioquia: río Guadualito (19).
- Dacnis cayana coerebicolor* Sclater
Antioquia: entre Zaragoza y Anorí.
Santander: El Centro (4), Monte Bello (9).
Cundinamarca: Puerto Salgar.
Tolima: Mariquita, Carmen de Apicalá, Melgar, Guamo.
- Dacnis cayana ultramarina*
Lawrence
Chocó: Titumate (19).
- Dacnis cayana glaucogularis*
Berlepsch y Stolzmann
Nariño: río Churuyaco (16).
- Dacnis cayana* subsp
Bolívar: Arroyo Camaroncito (20a).
- Dacnis viguieri* Salvin y Godman
Antioquia: río Tulapa (19).
- Dacnis flavicenter* Lafresnaye y d'Orbigny
Nariño: río San Miguel (16).
Vaupés: Mitú (30).
- Chlorophanes spiza spiza*
(Linneo)
Vaupés: Mitú (32).
- Chlorophanes spiza subtropicalis*
Todd

Santander: El Centro (4), Vélez, Barrancabermeja.

Arauca: río Arauca (2), río Bojajá (2).

Boyacá: Fátima (2), río Cobugón (El Porvenir) (2).

Cundinamarca: Sasaima (31d), La Vega (31d).

Chlorophanes spiza exsul Berlepsch y Taczanowski

Nariño: La Guayacana (1).

Chlorophanes spiza caerulescens

Cassin

Meta: Guamal, Los Micos (3), río Guayapa (3), río Guejar.

Vaupés: Mitú.

Caquetá: río Orteguzza (La Primavera), Ceilán S. de Florencia.

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyaco (16).

TERSINIDAE

Tersina viridis occidentalis

(Sclater)

Norte de Santander: El Diamante, Santa Librada, Sarare, Lourdes, Bochalema.

Tolima: Ataco (27), Mariquita.

Meta: Acacias, Restrepo, Pepirol, San Antonio, Los Micos (3), río Guapaya (3), río Guayabero (28), Remolino, Cumaral.

Vaupés: Mitú (31), Sabanas del Cubiyú (31).

Caquetá: Florencia, La Vega.

THRAUPIDAE

Chlorophonia cyanea longipennis
(Du Bus)

Meta: Villavicencio.

Observada por primera vez en la región.

Chlorophonia cyanea intensa

Zimmer

Valle: San Antonio (24a), Cerro de la Horqueta (21), Mares (21) y Elvira (21). Todas estas localidades en la Cordillera Occidental, entre 18 y 20 kilómetros al oeste de Cali, 2.000 a 2.200 metros sobre la carretera a Buenaventura.

Chlorophonia flavirostris minima

Blake

Nariño: La Guayacana (1).

Chlorophonia pyrrhophrys (Sclater)

Boyacá: Leiva.

Valle: San Antonio (24a).

Euphonia musica intermedia Chubb

Magdalena: El Cauca (13).

Norte de Santander: Chinácota, Cúcuta, Villa Feliza (13), Palo Gordo (13).

Santander: Peña Blanca (13), La Donjuana, Pamplona.

Boyacá: Soatá (7), Miraflores y Páez (29).

Cundinamarca: Jerusalén (31d), El Peñón, Quetame.

Valle: San Antonio (24a).

Para el uso de *Euphonia* por *Tarragra*, Cf. de Schauensee (17b, primera *addenda* y *corrigenda*).

Euphonia xanthogaster trevirostris

Bonaparte

Cdmrca.: Fusagasugá (31d), Yacopí (31d), La Vega (31d).

Meta: Pico Renjifo (3), Acacias.
 Vaupés: Mitú (30).
 Nariño: río San Miguel y río
 Churuyaco (16).

Euphonia xanthogaster exsul

Berlepsch
 Magdalena: Cerro Alto del Cedro
 (Sierra de Perijá) (17).
 Boyacá: río Cobugón (2), Fátima
 (2), La Primavera (lado oriental
 de los Andes Orientales) (2).

Euphonia anae rufivertex Salvin

Chocó: Acandí (36).

Euphonia fulvicrissa omissa Hartert

Antioquia: río Guadualito (19),
 entre Zaragoza y Anorí.
 Santander: El Centro (4).
 Cundinamarca: Puerto Salgar.

Euphonia fulvicrissa purpurascens

Hartert
 Cauca: Guapi (26).

Euphonia minuta minuta Cabanis

Caquetá: Florencia.
 Amazonas: Leticia.

Euphonia minuta humilis (Cabanis)

Antioquia: río Guadualito (19).

Euphonia trinitatis Strickland

Guajira: Maicao.
 Es más claro este material (1 hem-
 bra adulta) en las regiones inferio-
 res que dos ejemplares de Tocaha-
 gua (Atlántico).

Euphonia chlorotica cynophora

(Oberholser)

Boyacá: Palmar (río Casanare)
 (19).

Meta: Tanané.

Euphonia concinna Sclater

Cundinamarca: El Colegio (31d),
 Fsgasugá. (31d), Sasaima (31d),
 Albán (31d), La Vega (31d), Gi-
 rardot, Rafael Reyes.
 Tolima: Carmen de Apicalá, Mel-
 gar, Mariquita (13), Guamo
 (25a).
 Huila: Garzón.

Euphonia lanirostris crassirostris

Sclater
 Bolívar: Arroyo Playón (20a),
 San Juan Nepomuceno (20a).
 Norte de Santander: Cúcuta, Lour-
 des, Gramalote, El Diamante, Chi-
 nácota, Tibú.
 Antioquia: río Mulatos (19), Son-
 són (31b).
 Santander: El Centro (4), río Chi-
 camocha (Pescadero), San Vicente.
 Arauca: río (Arauca) (2).
 Boyacá: río Cobuyón (El Porve-
 nir) (2), Soatá (7), Miraflores.
 Guainía: Obando (Puerto Iníri-
 da) (31c).
 Cundinamarca: Sasaima (31d),
 Arbeláez (31d), Puerto Salgar
 (31d), El Colegio (31d), La Ve-
 ga (31d), Fusagasugá (31d), San-
 tandercito, Choachí, San Antonio
 de Tena, Rafael Reyes.
 Caldas: Chinchiná (7).
 Tolima: Guamo (25a), Carmen
 de Apicalá.
 Huila: Villavieja (23), Neiva.

Euphonia laniirostris melanura

Sclater

Boyacá: Miraflores (29), Palmar (río Casanare) (13).

Meta: Los Micos (3), río Guayapa (3), río Guayabero (28), Guamal.

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Puerto Nariño (31b).

Euphonia rufiventris (Vieillot)

Caquetá: Villa María (río Ortegua).

Vaupés: Mitú (32), Selvas aledañas al Caño Cubiyú.

Tangara velia iridina (Hartlaub)

Meta: río Guapaya (3).

Vaupés: Mitú (32).

Tangara callophrys (Cabanis)

Caquetá: Ceilán (sur de Florencia).

Chlorochrysa phoenicotis

(Bonaparte)

Antioquia: Ventanas (Yarumal).

Nariño: Altaquer.

Pipraeidea melanonota venezuelensis (Sclater)

Cundinamarca: Choachí (31d), La Vega (31d), Une (31d), Fugasagugá, Laguna de Pedropalo.

Valle: San Antonio (24a).

Pseudodacnis hartlaubi (Sclater)

Quindío: Calarcá.

Cundinamarca: Laguna de Pedropalo.

Valle: Las Pavas (al pie y al occidente de La Cumbre) (13), La Cumbre (13).

Tangara chilensis coelicolor

(Sclater)

Meta: río Guejar.

Vaupés: Mitú (30).

Tangara chilensis chilensis

(Vigors)

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyacu (16).

Caquetá: Villa María (río Ortegua).

Tangara schrankii schrankii

(Spix)

Nariño: río San Miguel y río Churuyacu (16).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Tangara schrankii anchicayæ

Lehmann

Valle: río Anchicayá (21, 17).

Tangara guttata bogotensis

Hellmayr y Seilern

Norte de Santander: Santa Librada, Sarare, La Donjuana.

Tolima: Icononzo.

Meta: Pico Renjifo (3).

Anteriormente *Calospiza* o *Tangara chrysophrys bogotensis*.*Tangara xanthogastra xanthogastra*

Sclater)

Meta: La Macarena, río Guapaya (3), Los Micos (3).

Nariño: río San Miguel y río Churuyaco (16).

Tangara arthus sclateri

(Lafresnaye)

Meta: Pico Renjifo (1, 3).

Tangara arthus aurulenta

(Lafresnaye)

Cundinamarca: Albán (31d), Paimé (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo.

Tangara arthus occidentales

Chapman

Cauca: Popayán.

Tangara xanthocephala venusta

(Sclater)

Meta: Pico Renjifo (3), Quetame (Monterredondo).

Tangara parzudakii parzudakii

(Lafresnaye)

Cundinamarca: Laguna de Pedropalo (31d), San Juan de Rioseco (31d), Albán (31d), La Vega (31d), Quetame, Aguabonita (31d).

Tangara labradorides labradorides

(Boissoneau)

Cundinamarca: Fontibón, Albán (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d).

Tolima: Icononzo.

Tangara cyanicollis hannahiae

(Cassin)

Norte de Santander: La Donjuana, El Diamante, Pamplonita.

Tangara cyanicollis caeruleocephala

(Swainson)

Meta: Acacias, Villavicencio.

Tangara cyanicollis granadensis

(Berlepsch)

Antioquia: Barbosa.

Santander: San Gil, Barrancabermeja, Simacota.

Boyacá: Miraflores (29).

Cdmarca.: Santandercito (31d), El Colegio (31d), Laguna de Pedropalo (31d), El Peñón, Villeta, San Antonio de Tena, Quetame.

Tolima: Ataco (27), Melgar.

Valle: Angélica.

Tangara nigrocincta nigrocincta

(Bonaparte)

Meta: Caño Yerlí.

Caquetá: Villa María (río Ortegua).

Tangara nigrocincta fanny

(Lafresnaye)

Caldas: La Victoria.

Cundinamarca: Puerto Salgar.

Cauca: Guapi (26).

Tangara ruficervix ruficervix

(Prevost y Des Murs)

Cundinamarca: Albán (31d), Sasaíma (31d), San Miguel (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo.

Valle: San Antonio (24a).

Tangara mexicana boliviana

(Bonaparte)

Meta: Chafurray, río Ariari, río Guapaya (3), Los Micos, Guamal.

Caquetá: Ceilán (Florencia).

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyaco (16).

Amazonas: Puerto Nariño.

Tangara palmeri (Hellmayr)

Valle: río Anchicayá (21).

Tangara inornata inornata

(Gould)

Antioquia: Sonsón (31b).

Santander: El Centro (4), Barrancabermeja.

Cundinamarca: La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d).

Tangara gyrola toddi

(Bangs y Penard)

Norte de Santander: Santa Librada, La Donjuana.

Boyacá: Fátima (2), río Cobugón (La Argentina) (2).

Tangara gyrola delecticia

(Bangs)

Antioquia: Caldas, entre Zaragoza y Anorí.

Santander: San Vicente de Chururí.

Caldas: Chinchiná (5).

Cundinamarca: Albán, Silvania, San Francisco, El Colegio (31d), La Vega (31d), Santandercito (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Villeta, El Peñón.

Tangara gyrola catharinae

(Hellmayr)

Cundinamarca: Susunuco.

Meta: Acacias, río Guayapita, Pico Renjifo (3).

Nariño: río Churuyaco (16).

Tangara vitriolina (Cabanis)

Antioquia: Yarumal, Jericó.

Santander: Pescadero, San Gil, Simacota.

Boyacá: Soatá, Alto de Onzaga (7).

Cdmarca.: Santandercito (31d), El Hospicio (31d), Anapoima, Rafael Reyes, San Francisco (31d), El Ocaso (31d), La Vega (31d), Sasaima (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Sabana de Bogotá (31d), El Peñón, San Antonio de Tena.

Risaralda: Pereira.

Tolima: Melgar, Ataco (27), Carmen de Apicalá.

Huila: Garzón, Neiva.

Anteriormente *Tangara ruficapilla*; para el cambio por *vitriolina* Cf. de Schauensee (17b).*Tangara cayana cayana* (Linneo)

Norte de Santander: Cúcuta (6), Bochalema, Pamplona, La Donjuana (La Selva).

Meta: río Güejar, río Ariari, Los Micos (3), Tanané (6), Puerto Gaitán, Cumaral.

Vaupés: Sabanas del Cubiyú (31).

Tangara nigroviridis nigroviridis

(Lafresnaye)

Boyacá: La Primavera (lado Oriental de los Andes Orientales) (2).

Meta: Pico Renjifo (3).

Nariño: Cerro Pax (16), río San Miguel (16).

Tangara nigroviridis consobrina

Hellmayr

Cundinamarca: Zipacón (Alto de Sebastopol) (31d), Tequendama (31d), Albán (31d), San Miguel (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Aguabonita (31d).

Tangara vassorii vassorii

(Boissonneau)

Ant.: Boquerón (Cerro Azul).

Norte de Santander: Pamplona (24b).

Boyacá: Arcabuco.

Cund.: La Aguadita (31d), El Salto (31d), La Vega (31d), Silvania (31d), Une (31d), San Miguel (31d), Fusagasugá, Aguabonita.

Tangara heinei (Cabanis)

Norte de Santander: Pamplonita, La Donjuana (La Selva).

Cundinamarca: Albán (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Bogotá.

Iridosornis rufivertex rufivertex

(Lafresnaye)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Mutiscua, Toledo.

Cundinamarca: Boquerón de Chipaque (31d).

“Uno de los ejemplares de Boquerón de Chipaque (mayo 21) es joven; la cabeza es negra con unas pocas plumas rojizo amarillentas; el resto de la coloración es negra con la espalda teñida de azul morado, los vexilos externos de las rémiges y rectrices teñidos de azuloso; las regiones inferiores que son negras llevan manchas azules en el pecho y de castaño anteado en el abdomen, el crissum y coberteras infracaudales son de castaño”. Cf. Olivares (31d).

Anisognathus igniventris lunulatus
(Du Bus)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Mutiscua.

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Arcabuco, Motavita.

Cundinamarca: La Calera (31d), Albán (31d), Sopó (31d), Usaquén (31d), Silvania (31d), entre la Laguna de La Herrera y La Mesa (31d), Chía (31d), Bojacá (31d), El Chicó, Torca (31d), Zipaquirá (31d), Usme, La Calera (31d), Boquerón de Chipaque, Páramo de Guasca.

Anisognathus lacrymosus olivaceiceps (Berlepsch)

Antioquia: San Pedro, Yarumal.

Tolima: Herbeo.

Anisognathus lacrymosus palpebrosus
(Lafresnaye)

Cauca: El Tambo, Munchique.

Anisognathus lacrymosus tamae

Phelps y Gilliard

Norte de Santander: Páramo de Fontibón (17), Toledo, Pamplona (24b).

Boyacá: La Primavera (lado Oriental de los Andes Orientales) (2).

Anisognathus lacrymosus pallidior-salis Phelps y Phelps

Magdalena: Sierra de Perijá (La Africa) (36, 17), (al pie del Cerro Pintado) (36, 17), Laguna de Junco, Cerro Pintado, Hiroca (36, 17).

Anisognathus flavinucha victorini
(Lafresnaye)

Cundinamarca: Albán (31d), La Vega (31d), Aguadita (31d), Fusagasugá (31d), Laguna de Pedropalo (31d).

Tolima: Cunday.

Anisognathus flavinucha antioquiae
(Berlepsch)

Antioquia: Santuario, San Pedro, Caramanta.

Buthraupis montana gigas
(Bonaparte)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Mutiscua.

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Miraflores.

Cund.: La Aguadita (31d), Aguanbonita (31d), San Miguel (31d), Bojacá.

Un macho de La Aguadita es bastante grande: ala, 141 mm.

Es frecuente pero difícil de capturar porque busca los sitios de vegetación más densa; se le observa solitaria o por parejas en ramas no muy altas y continuamente se le oye un psí-psí-psí.

Buthraupis eximia eximia
(Boissonneau)

Norte de Santander: Pamplona (24b).

Bangsia rothschildi (Berlepsch)
Nariño: La Guayacana (1).

Bangsia melanochlamys (Hellmayr)
Antioquia: Yarumal.

Dubusia taeniata taeniata
(Boissonneau)

Norte de Santander: Pamplona (24b).

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Motavita.

Cundinamarca: La Calera (31d), Lagunas de Chisacal (31d), Chicó (Bogotá) (31d), Boquerón de Chipaque (31d), La Aguadita (31d), San Miguel (31d), Chocotá (31d), Usaquén (31d), Sopó (31d).

Thraupis episcopus cana
(Swainson)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Magdalena: Isla de Salamanca.

Bolívar: Yatí (20a).

Norte de Santander: La Donjuana, Pamplonita, Santa Librada, Sarare, Pamplona (24b), Petrólea, Catatumbo (río de Oro), Tibú.

Antioquia: río Mulatos (19), Casabe.

Chocó: río Tanela.

Santander: Pescadero, San Gil, El Centro (4).

Arauca: río Arauca (2), río Cobaría (La Ceiba) (2).

Boyacá: Soatá (7).

Cundinamarca: Girardot (31d), Sasaima (31d), Santandercito (31d), El Hospicio (31d), Zipacón (31d), hacia Boquerón de Melgar (31d), Laguna de Pedropalo, San Miguel, El Peñón, Rafael Reyes.

Caldas: Manizales.

Tolima: Ataco (27), Guamo (25a).

Huila: Neiva.

Por muchos años se dijo *T. virens*.

Thraupis episcopus quaesita

Bang y Noble

Cauca: Guapi (26).

Thraupis episcopus leucoptera

(Sclater)

Boyacá: Miraflores (29), Pore.

Cundinamarca: Usaquén (31d),

Cáqueza (31d), Ubaque (31d),

Une (31d).

Meta: Restrepo, Los Micos (3),

San Juan de Arama, Guamal, Cumaral, Puerto López.

Thraupis episcopus mediana

Zimmer

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Vaupés: Santa Cruz de Waracapurí (25), Mitú (32).

Thraupis episcopus coelestis

(Spix)

Caquetá: Florencia, Villa Fátima (río Ortegúaza), Montañitas Venecia.

Nariño: río San Miguel (16).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Puerto Nariño, Leticia.

Thraupis sayaca glaucocolpa

Cabanis

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Thraupis palmarum atripennis Todd

Bolívar: Arroyo Camaroncito (20a).

Antioquia: Caldas, río Guadualito (19), entre Zaragoza y Anorí. Chocó: río Tanela (19).

Santander: Pescadero, El Centro (4), Vélez.

Cundinamarca: Puerto Salgar (31d).

Caldas: La Dorada, Manizales.

Tolima: Ataco (27), Melgar, Mariquita, Carmen de Apicalá, Guamo (25a).

Valle: San Antonio (24a).

Cauca: Guapi (26).

Thraupis palmarum melanoptera

(Sclater)

Norte de Santander: El Diamante, Catatumbo (río de Oro), Tibú.

Boyacá: Pore.

Cundinamarca: Quetame (31d).

Meta: Acacias, Puerto López, río Ocoa, río Guayabero (28), Los Micos (3), río Guayapa (3), Cumaral, Laguna de Tanané, Puerto Gaitán.

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Caquetá: río Ortegúaza.

Vaupés: Mitú (25), Caño Cuduyarí, Sabanas del Cubiyú.

Amazonas: Leticia, Puerto Nariño.

Thraupis cyanocephala auricrissa

(Sclater)

Boyacá: Alto de Onzaga (17), La Primavera (lado Oriental de los Andes Orientales) (2).

Cundinamarca: Bojacá (31d), Tequendama (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Aguabonita (31d), Une, Zipacón.

Ramphocelus nigrogularis (Spix)

Meta: río Guayapa (3).

Caquetá: río Pescado, Quebrada Santa Rita, Florencia.

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyacu (16).

Putumayo: Puerto Asís (31a), río Guamués.

Amazonas: Puerto Nariño.

Ramphocelus carbo carbo

(Pallas)

Meta: río Guayabero (28).

Vichada: Santa Teresita.

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Vaupés: Mitú (25), Sabanas del Cubiyú, Santa Cruz de Waracapurí (25), Villa Fátima, San José del Guaviare.

Caquetá: Milán.

Nariño: río San Miguel (16).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Puerto Nariño.

Ramphocelus carbo unicolor

Sclater

Meta: Restrepo, Cumaral, Bocas del Zanza, Los Micos (3), río Guayapa (3), Guamal, Cubarral, Pachaquiario, Puerto Gaitán, Laguna de Tanané.

Ramphocelus carbo venezuelensis

Lafresnaye

Norte de Santander: Santa Librada (Sarare).

Boyacá: río Cobuyón (2), Fátima (2), Miraflores (29).

Arauca: río Arauca (2), río Bojabá (2), río Cobaría (La Ceiba) (2).

Ramphocelus dimidiatus dimidiatus

Lafresnaye

Magdalena: Región de Santa Marta: Don Diego (15), La Concepción (15), Trojas de Cataca (15), Minca (15), Pueblo Viejo (15).

Bolívar: Palomino (15).

Límites Córdoba-Antioquia: Quimari (15).

Córdoba: Murrucucú y Tierra Alta (15), Quebrada Charrura (20a).

Norte de Santander: La Mucurera, Rosario, Guayabal, Tibú, Santiago, río Zulia, río Peralonso, Astillero, Petrólea, río de Oro.

Antioquia: Casabe, entre Zaragoza y Anorí.

Chocó: Sautatá (19), Tulipa (19).

Santander: San Gil, El Centro (4), El Guadual, Vélez, (Campo Capote), San Vicente, El Carare, Simacota.

Ramphocelus dimidiatus dimidiatus x molochinus

Antioquia: Sonsón (río La Miel) (31b).

Ramphocelus dimidiatus molochinus

de Schauensee

Cund.: Santandercito (31d), La Mesa (31d), Arbeláez (31d), Puerto Salgar (31d), Viotá (31d), El Colegio (31d), La Vega (31d), El Hospicio (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Sabana de Bogotá, Bogotá, El Peñón, San Antonio de Tena (31d).

Caldas: Santa Cecilia y Suárraga (15), Victoria, La Dorada.

Tolima: Mariquita, Gualanday, Espinal, Ataco (27), Carmen de Apicalá, Guamo (25a).
Huila: Villavieja (22), Garzón.

Ramphocelus flammigerus

(Jardine y Selby)

Antioquia: Copacabana, Caldas, Medellín, Envigado.

Caldas: Manizales.

Nariño: La Unión.

Ramphocelus icteronotus

Bonaparte

Antioquia: Angelópolis, Puerto Berrío, río Guadualito (19), entre Zaragoza y Anorí.

Chocó: Sautatá (19), Unguía (19), Titumate (19), río Tolo (19), río Salaquí.

Santander: El Centro (4), San Vicente.

Cauca: Guapi (26).

Piranga rubra rubra (Linneo)

Norte de Santander: Cúcuta, Santa Librada, Sarare, La Donjuana.

Antioquia: Turbo (19), Fredonia, entre Zaragoza y Anorí.

Chocó: Sautatá (19), Unguía (19), río Tanela (19).

Santander: El Centro (4), Simacota.

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Miraflores (29).

Cund.: La Aguadita (31d), Santandercito (31d), Bosa (31d), Subachoque, Sasaima (31d), Albán (31d), Usme (31d), Une (31d), Puerto Salgar (31d), Viotá (31d), Ubaté (31d), Chía (31d), Bogotá (31d), Aguabonita (31d).

Tolima: Icononzo, Carmen de Apicalá, Guamo (25a).

Meta: Acacías, Los Micos (3), río Guayabero (28), San Martín, Cubarral.

Cauca: Guapi (26).

Vaupés: Santa Cruz de Waracapurí (25).

El material no anotado anteriormente en la literatura se coleccionó de los primeros días de octubre a últimos de marzo.

Piranga rubra subsp

Bolívar: Arroyo Playón (20a), Lázaro (20a), Arroyo Tigre.

Piranga flava faceta Bangs

Norte de Santander: Cúcuta, La Selva, La Donjuana.

Santander: San Gil.

Piranga olivacea (Gmelin)

Santander: San Vicente.

Boyacá: Tunja.

Cundinamarca: La Calera (31d), Aguadita (31d), Sasaima (31d), Zipaquirá (31d), Sopó (31d), La Vega (31d), Fusagasugá (31d), Ubaté (31d), Chía (31d), Bogotá (31d), Medina, Laguna de Pedropalo.

Meta: Plaza Bonita, río Guapaya (3), Pico Renjifo (3).

Piranga leucoptera venezuelae

Zimmer

Norte de Santander: Santa Librada, Sarare, La Palmita (13).

Cundinamarca: La Vega (31d), Laguna de Pedropalo.

Piranga rubriceps G. R. Gray

Antioquia: La Ceja.

Boyacá: Alto de Onzaga (7).

Nariño: Cerro Pax (16).

Habia rubica rhodinolaema

(Salvin y Godman)

Meta: San Juan de Arama (1),

río Guapaya (1), Los Micos (3),

río Guapaya (3).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Habia rubica perijana

Phelps y Phelps

Magdalena: Sierra de Perijá, Cerro Alto del Cedro (17).

Habia rubica subsp

Límites Córdoba-Antioquia: Quimari (15).

Habia fuscicauda erythrolaema

(Sclater)

Bolívar: Coloso (13), Cansona

(20a), San Carlos (20a), Arroyo

Playón (20a), San Cristóbal

(20a).

Habia gutturalis gutturalis

(Sclater)

Santander: Montebello (9), Vélez

(Campo Capote), San Vicente.

Caldas: Victoria.

Cundinamarca: Puerto Salgar.

Lanio fulvus peruvianus

Carriker

Arauca: río Cobaría (La Ceiba) (2).

Boyacá: río Cobuyón (El Porvenir) (2), La Argentina (2).

Tachyphonus rufus (Boddaert)

Antioquia: Angelópolis.

Norte de Santander: Salazar, Chínacota, Bochalema, Lourdes, La Donjuana, Gramalote, río Zulia oeste de Cúcuta.

Santander: Simacota.

Boyacá: Soatá (22), Miraflores.

Cundinamarca: Sasaima (31d),

La Vega (31d), Une (31d), El

Peñón.

Tolima: Ataco (27), Mariquita.

Meta: Restrepo, Cumaral, Guamal, Cubarral.

Caquetá: Florencia.

Tachyphonus cristatus cristatellus

Sclater

Meta: Acacias, río Guayabero.

Vaupés: Mitú (32).

Caquetá: Florencia.

Tachyphonus surinamus brevipes

Lafresnaye

Meta: Acacias, Los Micos (3), río

Guayapa (3), río Güejar.

Vaupés: Mitú (3), Caños Cuyudari, Sabanas del Cubiyú.

Caquetá: Aserrío, río Pescado,

La Providencia, río Orteguzza, Vi-

lla Fátima.

Tachyphonus phoenicius Swainson

Meta: río Guayabero (28).

Vaupés: Sabanas del Cubiyú

(31).

Tachyphonus luctuosus luctuosus

Lafresnay y d'Orbigny

Norte de Santander: Santa Librada, Sarare.

Boyacá: Fátima (2), río Cobuyón

(2), Miraflores (corregimiento de

Páez).

Arauca: río Arauca (2), río Co-
baría (La Ceiba) (2), río Boja-
bá (2), corregimiento de Páez
(Miraflores).

Meta: Acacias, Pachaquiario, río
Guapayita.

Caquetá: Florencia.

Nariño: río San Miguel (16), río
Churuyacu (16).

Tachyphonus luctuosus panamensis

Todd

Bolívar: San Cristóbal.

Norte de Santander: Petrólea, Ti-
bú, Puerto Villamizar, Catatum-
bo, río de Oro.

Chocó: río Tanela (19).

Santander: El Centro (4), San
Vicente, Barrancabermeja.

Caldas: La Victoria.

Cundinamarca: Girardot (31d).

Tolima: Gualanday, Melgar, Gua-
mo (25a).

Tachyphonus delatrui delatrui

Lafresnaye

Antioquia: entre Zaragoza y
Anorí.

Cauca: Guapi (26).

*Heterospingus xanthopygius xantho-
pygius* (Sclater)

Límites Córdoba-Antioquia: Qui-
marí (15).

Santander: Vélez (Campo Ca-
pote).

Cundinamarca: Cachipay (31d).

Tolima: Cunday.

Eucometis penicillata cristata

(Du Bus)

Norte de Santander: Tibú, Petró-
lea.

Santander: San Vicente.

Chocó: río Tanela (19).

Arauca: río Arauca (2), río Bo-
jabá (2).

Cundinamarca: Viotá (31d), La
Vega (31d), Puerto Salgar.

Tolima: Gualanday, Chicoral.

Mitrospingus cassinii cassinii

(Lawrence)

Valle: río Raposo.

Antioquia: entre Zaragoza y
Anorí.

Cauca: Guapi (26).

Rhodinocichla rosea harterti

Hellmayr

Cund.: Santandercito (31d), Sa-
saima (31d), La Vega (31d),
Fusagasugá (31d).

Rhodinocichla rosea beebei

Phelps y Phelps

Magdalena: Sierra de Perijá, Lí-
mites entre Colombia y Venezuela.
Cerro Alto del Cedro (17).

Hemithraupis guira guirina

(Sclater)

Tolima: Cunday.

Hemithraupis guira nigrigula

(Boddaert)

Boyacá: río Cobuyón (El Porve-
nir) (2).

Hemithraupis flavicollis albigularis

(Sclater)

Santander: El Centro (4), Ba-
rrancabermeja.

Hemithraupis flavicollis peruana
Bonaparte
Nariño: río San Miguel (16).

Erythrothlypis salmoni (Sclater)
Chocó: Quibdó (13), Malaguitta
cerca de la boca del río San Juan
(13).
Valle: Córdoba cerca a Buenaven-
tura (13).

Thlypopsis fulviceps fulviceps
Cabanis
Norte de Santander: La Donjuana.

Carriker (1955: 61) pone en du-
da la existencia de la subespecie no-
minada en Colombia; material de
Norte de Santander (La Palmita) lo
cataloga como *T. f. intensa* Todd.
Además dice que La Palmita (locali-
dad tenida del Magdalena) es en el
departamento de Norte de Santan-
der y agrega: "is very close to the
divide between the Magdalena water-
shed and the rio Tarra, main source
of the Catatumbo".

Chlorospingus ophthalmicus eminens
Zimmer
Norte de Santander: Chitagá,
Pamplona (24b), Toledo.
Boyacá: La Primavera (Lado
Oriental de los Andes Orientales)
(2).
Arauca: río Bojabá (2).

*Chlorospingus ophthalmicus flavo-
pectus* (Lafresnaye)
Boyacá: Soatá.
Cund.: La Aguadita (31d), Agua-
bonita (31d), San Miguel (31d).

*Chlorospingus ophthalmicus maca-
renae* Zimmer
Boyacá: Pajarito (Alto río Cusia-
na) (31e).
Meta: Pico Renjifo (3).

*Chlorospingus ophthalmicus nigri-
ceps* Chapman
Antioquia: San Pedro, Retiro, Lla-
nos de Ovejas.

*Chlorospingus flavigularis flavigula-
ris* (Sclater)
Boyacá: Pajarito (Alto río Cusia-
na) (31e).
Meta: Acacías.

*Chlorospingus canigularis canigula-
ris* (Lafresnaye)
Boyacá: Alto de Onzaga (7).
Cundinamarca: Albán (31d), La
Vega (31d), Aguabonita (31d),
Mosquera, La Mesa (31d), San
Miguel (31d).

Cnemoscopus rubrirostris rubrirostris
(Lafresnaye)
Boyacá: Rondón.
Cundinamarca: Choachí, San Mi-
guel, Aguabonita.

*Hemispingus superciliaris supercilia-
ris* (Lafresnaye)
Cund.: Chipaque (31d), San Mi-
guel (31d), Páramo de Guasca
(31d), Subachoque (31d), Chía
(31d), Torca (31d), El Chicó
(31d), entre Zipaquirá y Pacho.

Hemispingus frontalis frontalis
(Tschudi)
Cundinamarca: El Colegio (31d),

- La Vega (31d), Aguabonita (31d).
- Hemispingus frontalis flavidorsalis*
Phelps y Phelps
Boyacá: Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).
- Hemispingus melanotis melanotis*
(Sclater)
Cund.: Anolaima (31d), Tequendama (31d), Sylvania (31d), Aguabonita (31d).
- Urotraupis stolzmanni*
Taczanowski y Berlepsch
Cauca: Volcán de Puracé (Mina de azufre cerca a Popayán) (13).
- Chlorornis riefferii riefferii*
(Boissonneau)
Antioquia: La Ceja.
Boyacá: Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).
Cundinamarca: Páramo de Guasca (31d), Sylvania (31d), Aguabonita (31d), Aguadita (31d).
- Cissopis leveriana leveriana*
(Gmelin)
Norte de Santander: Petrólea, La Javilla, Tibú.
Boyacá: Miraflores (6, 29).
Meta: Acacias, Restrepo, río Guayabero (28), Cubarral, Guamal.
Cund.: Guayabetal (31d).
Caquetá: Montañitas.
Vaupés: Mitú (30), Caño Cuduyarí.
Nariño: río San Miguel y (río Churuyacu) (16).
Putumayo: Puerto Asís (31a).
Amazonas: Puerto Nariño.
- Schistochlamys melanopis aterrima*
Todd
Norte de Santander: Gramalote, La Donjuana, Chinácota, Pamplo-nita.
Vichada: Santa Teresita (31c).
Cund.: Sasaima (31d).
Tolima: Carmen de Apicalá, Melgar.
Caldas: Victoria.
Valle: Cali.
Meta: La Argentina, Plaza Bonita, Remolino (río Meta), Los Micos (3), río Guayabero (28), Puerto López, Cumaral, Cubarral.
Vaupés: Mitú (32), Sabanas del Cubiyú, San José del Guaviare.
Caquetá: Villa Fátima, Montañitas.
- ICTERIDAE
- Zarhynchus wagleri ridwayi*
van Rossem
Antioquia: río Mulatos (19), Turbo (19).
Chocó: río Juribidá (Nuquí), Unguía (19).
Santander: Monte Bello (9).
Cauca: Guapi (26).
- Gymnostinops guatimozinus*
(Bonaparte)
Antioquia: Casabe.
Santander: Barrancabermeja.
- Gymnostinops yuracares yuracares*
(Lafresnaye y d'Orbigny)
Meta: La Macarena (Caño Yerlí), Los Micos (3), río Guapaya (3), río Guayabero (29).
Vaupés: Mitú (32), Caño Cuduyarí, San José del Guaviare.

Psarocolius decumanus decumanus

(Pallas)

Bolívar: San Cristóbal (20a).

Meta: río Guapaya (3), Caño Yerlí (3), río Guayabero (28).

Nariño: río San Miguel (16).

Vaupés: San José del Guaviare (30).

Psarocolius decumanus melanterus

(Todd)

Antioquia: río Mulatos (19), río Guadualito (19), Turbo (19).

Chocó: Sautatá (19).

Cundinamarca: Puerto Salgar.

Psarocolius viridis

(P. L. S. Müller)

Vaupés: Mitú (6, 32), Caño Cuduyarí.

Psarocolius angustifrons angustifrons

(Spix)

Meta: Puerto López, río Guayabero (28).

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyaco (16).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Puerto Nariño.

Psarocolius angustifrons sincipitalis

(Cabanis)

Boyacá: Muzo.

Tolima: Gaitania (27).

Cacicus cela cela (Linneo)

Norte de Santander: La Arenosa, Astillero, Puerto Santander.

Meta: Macarena (Plaza Bonita), Los Micos, río Guayapa (3), río Guayabero (28), Guamal, Cubarral.

Caquetá: Florencia.

Nariño: río San Miguel (16), río Churuyaco (16).

Vaupés: Mitú (32).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Cacicus cela vitellinus (Lawrence)

Antioquia: Casabe.

Chocó: Sautatá (19).

Santander: Monte Bello (9), río

Carare entre Cimitarra y San Fernando (31b).

Cacicus haemorrhous haemorrhous

(Linneo)

Meta: Caño Yerlí (3).

Vaupés: Mitú (31).

Cacicus leucorhamphus leucorhamphus

(Bonaparte)

Norte de Santander: Toledo.

Antioquia: La Ceja.

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Miraflores, Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Cund.: San Miguel (31d).

Cacicus solitarius (Vieillot)

Arauca: río Arauca (2), río Cobaría (2).

Boyacá: Miraflores (29).

Meta: río Guapaya (3), Acacias, Las Blancas, río Ocoa.

Nariño: río Churuyaco (16).

Caquetá: Florencia.

Amazonas: Leticia.

Cacicus holosericeus holosericeus

(Lichtenstein)

Bolívar: San Cristóbal (20a).

Cacicus holosericeus australis

(Chapman)

Norte de Santander: Pamplona, Chinácota.

Cund.: Aguabonita (31d), Tequendama (31d), Sopó (31d).

Scaphidura oryzivora oryzivora
(Gmelin)

Antioquia: río Mulatos (19), Turbo (19).

Norte de Santander: Catatumbo.

Santander: río Carare entre Cimitarra y San Fernando (31b).

Cund.: Gachetá (31d).

Meta: Los Micos (3), río Guayabero (28), río Ariari.

Huila: Villavieja (23).

Vaupés: San José del Guaviare (30), selvas y sabanas del Cubiyú (31).

Caquetá: Villa María (río Ortegaza), La Providencia (río Ortegaza).

Molothrus bonariensis cabanisii

Cassin

Córdoba: Quebrada Yeguas.

Magdalena: Isla de Salamanca.

Chocó: Sautatá (19).

Santander: Pescadero, San Gil.

Quindío: Calarcá.

Boyacá: Soatá (7).

Cundinamarca: Bosa (31d), Chía (31d), Sopó (31d), Utica, Puerto Salgar, El Peñón.

Tolima: Gaitania (27).

Huila: Villavieja (22).

Molothrus bonariensis aequatorialis
Chapman

Cauca: Guapi (26).

Molothrus bonariensis venezuelensis
Stone

Norte de Santander: Astillero, Tibú, El Diamante, Santiago, Catatumbo.

Boyacá: Miraflores (29).

Meta: Los Micos (3).

Molothrus bonariensis subsp

Caquetá: Villa María (río Ortegaza).

Macroagelaius subalaris

(Boissonneau)

Boyacá: Alto Onzaga (7).

Cundinamarca: Sylvania (31d), río Chocho (31d) (Fusagasugá), Aguabonita (31d).

Hypopyrrhus pyrohypogaster

(de Tarragon)

Tolima: Gaitania (27).

Quiscalus lugubris lugubris

Swainson

Arauca: Rondón (6).

Boyacá: El Viso (río Tucuya), Llanos de Casanare, Monterrey, Pore.

Meta: Villavicencio, La Realidad, río Ocoa, Quenane, Apiay (6), San Carlos de Guaroa, Peralonso.

Cassidix mexicanus peruvianus

(Swainson)

Magdalena: Isla de Salamanca.

Bolívar: Isla del Rosario.

Cauca: Guapi (26).

Icterus galbula (Linneo)

Meta: río Ariari.

Coleccionado en enero.

Icterus spurius (Linneo)

Antioquia: Casabe.

- Meta: Caños Negros (6).
El ejemplar de Casabe es de marzo 7.
- Icterus chysocephalus* (Linneo)
Meta: Restrepo.
Vaupés: Mitú (32), Villa Fátima, Caño Cuduyarí.
Caquetá: Villa María (río Ortegaza).
- Icterus mesomelas carrikeri*
Todd
Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).
Bolívar: Arroyo Tigre (20a), Arroyo Playón (20a).
Norte de Santander: Petrólea.
Santander: La Albania.
Chocó: Acandí (19), Sautatá (19).
Cundinamarca: Yacopí (31d), Puerto Salgar.
Cauca: Guapi (26).
- Icterus auricapillus* Cassin
Bolívar: Cansona (20a).
Norte de Santander: Astillero (río Zulia), Cúcuta.
Antioquia: Turbo (19).
Arauca: río Cobugón (2).
Cundinamarca: San Juan de Rioseco (31d).
Meta: Guamal.
Tolima: El Espinal, Carmen de Apicalá.
- Icterus crhysater giraudii* Cassin
Norte de Santander: Cúcuta.
Santander: Pescadero, San Gil, Simacota.
Boyacá: Alto de Onzaga (7), Miraflores (29), Páez (29).
- Cundinamarca: Guasca (31d), Ubaque, Usaquén (31d), Chía (31d), La Vega (31d), La Mesa (31d), Aguabonita (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Ubaté (31d), Une (31d).
Tolima: Gaitania (27).
Meta: río Ariari.
Caquetá: Florencia.
- Icterus crhysater hondae* Chapman
Chocó: río Tanela (19), Titumate (19).
Cauca: Guapi (26).
- Icterus nigrogularis nigrogularis* (Hahm)
Guajira: Serranía de Macuira (Nazaret) (21a).
Magdalena: Isla de Salamanca.
Bolívar: Tenche (20a), Yatí (20a).
- Icterus icterus ridawayi* (Hartert)
Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira, Nazaret, Sietuhu, Titujura) (21a).
- Icterus croconotus croconotus* (Wagler)
Caquetá: Florencia.
Amazonas: Leticia.
Sobre la posición taxonómica de esta especie, Cf. de Schauensee (17b, 1966: 438), quien dice que debe ir a la especie *icterus*.
- Gymnomystax mexicanus* (Linneo)
Meta: Caños Negros (6), Villavicencio, Laguna de Tanané.
- Agelaius icterocephalus icterocephalus* (Linneo)

Magdalena: Isla de Salamanca.
 Bolívar: Magangué, Yatí (20a).
 Norte de Santander: (Puerto Santander).
 Chocó: Sautatá (19).
 Cundinamarca: Puerto Salgar.
 Tolima: Carmen de Apicalá, Melgar, Venadillo, Guamo (25a).
 Huila: Villavieja (23).
 Cauca: Santander.

Agelaius icterocephalus bogotensis
 Chapman

Boyacá: Lago de Fúquene y Chiquinquirá (1).
 Cundinamarca: Mosquera (31d), La Caro (31d), Fontibón (31d), Facatativá (31d), Torca (31d), Represa del Muña (31d), El Prado (31d), Sopó (31d).

Leistes militaris militaris (Linneo)

Guajira: (Nazaret) (21a).
 Magdalena: Isla de Salamanca.
 Antioquia: Turbo (19), Casabe.
 Caldas: La Victoria.
 Cund.: Puerto Salgar (31d), Anapoima (31d, 31b), Guaduas (31d).
 Tolima: Armero, Melgar.
 Valle: Cali.
 Meta: río Ariari (San Antonio), Restrepo, Plaza Bonita, Los Micos (3), Cumaral, Laguna de Tanané, Sabanas de Surimena, Puerto López, Sabanas de San Juan de Arama.
 Caquetá: Tres Esquinas.
 Putumayo: río Ortegua.

Sturnella magna meridionalis
 Sclater

Boyacá: La Uvita, Motavita, Alto de Onzaga (7), Soatá (7).

Cundinamarca: Cota (31d), Chocotá (31d), Sibaté (31d), La Aguadita (31d), San Benito (31d), La Vega (31d), Usaquén (31d), Lagunas del Chisacal (31d), Tabio (31d), Páramo de Guasca, Cajicá, Suesca.

Sturnella magna patricola Chubb

Boyacá: Monterrey (Llanos de Casanare).
 Meta: Apiay, Cumaral, San Carlos de Guaroa.

Dolichonyx oryzivorus (Linneo)

Arauca: río Cobaría (2), La Ceiba (2).
 Boyacá: Tunja.
 Cundinamarca: Gachetá (31d).
 Meta: Plaza Bonita, Los Micos (3), Puerto López.
 Nariño: río Churuyaco (16).
 Vaupés: Saratama (18), Sabanas del Cubiyú.
 El ejemplar de Boyacá, es de Oct. 20. Otros así: Puerto López Abr. 16, Sabanas del Cubiyú Abr. 29 y May 8.

CATAMBLYRHYNCHIDAE

Catamblyrhynchus diadema diadema
 Lafresnaye

Antioquia: San Pedro.
 Norte de Santander: Pamplona (24b).
 Cund.: La Tribuna (31d), Tequendama (31d), Bogotá (31d), La Calera (31d), San Miguel (31d), Páramo de Guasca (31d).
 Nariño: río San Miguel (16).

FRINGILLIDAE

Saltator maximus maximus

(P. L. S. Müller)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Norte de Santander: Tibú, La Donjuana, La Javilla.

Santander: El Centro (4).

Cundinamarca: Sasaima (31d), Puerto Salgar (31d), La Vega (31d).

Meta: Restrepo, Acacias, Cumaral, Los Micos (3), río Guayabero (28), Cubarral, Caños Negros (6), Carretera Villavicencio-Acacias (6), Villavicencio (6), Sabana de San Juan de Arama, Puerto Gaitán.

Nariño: río Churuyaco (16), río San Miguel (16).

Caquetá: Villa María (río Orteguaza).

Vaupés: Mitú (32), San José del Guaviare, Sabanas del Cubiyú.

Saltator maximus iungens Griscom

Magdalena: El Tambor (15).

Bolívar: Arroyo Playón (20a), Arroyo Tigre (20a).

Ant.: entre Zaragoza y Anorí.

Santander: Monte Bello (9), Puerto Wilches, Jurima, El Gualdual, río Chucurí.

Tolima: Carmen de Apicalá.

Cauca: Guapi.

Saltator atripennis caniceps

Chapman

Cund.: Aguabonita (31d), San Miguel (31d), Sylvania, La Vega (31d).

Saltator coerulescens plumbeus

Bonaparte

Magdalena: Isla de Salamanca.

Guajira: Mayapo, Serranía de Macuira (21a).

Bolívar: San Carlos.

Cund.: Puerto Salgar (31d).

Saltator coerulescens brewsteri

Bangs y Penard

Norte de Santander: Petrólea, río Zulia (Astillero), Puerto Santander, Tibú.

Boyacá: El Viso (río Tucuya).

Arauca: río Arauca (2).

Saltator coerulescens azarae

d'Orbigny

Boyacá: Miraflores, Páez (29).

Meta: Restrepo, Cubarral.

Caquetá: Villa María (río Orteguaza), Montañita.

Nariño: río Churuyaco (16), río San Miguel (16).

Amazonas: Leticia.

Saltator orenocensis rufescens

Todd

Guajira: Calonka (20), Ahuyama, Serranía de Macuira (21a).

Saltator albicollis striatipectus

Lafresnaye

Magdalena: Santa Marta.

Bolívar: Turbaco (33), San Carlos (20a), Cansona (20a).

Norte de Santander: Pamplonita.

Santander: Pescadero, El Centro (4), Simacota.

Boy.: Soatá (7), Miraflores (29).

Cund.: Guaduas (31d), Santandercito (31d), La Mesa (31d), El Chocho (Fusagasugá), Sasaima

- (31d), El Colegio (31d), La Vega (31d), Girardot (31d), El Hospicio (31d), Rafael Reyes, El Peñón, Laguna de Pedropalo, San Antonio de Tena, Arbeláez.
Risaralda: Pereira.
Tolima: Gualanday, Ibagué.
Huila: Garzón.
- Saltator albicollis perstriatus* Parkes
Guajira: Serranía de Macuira (Nazaret) (21a).
Magdalena: Aguachica (33).
Bolívar: Cartagena (33).
Norte de Santander: Bochalema, El Diamante, Cúcuta.
- Saltator albicollis perstriatus* x *striatipectus*
Magdalena: región de Santa Marta (33).
- Caryothraustes canadensis canadensis* (Linneo)
Vaupés: Mitú (32), Sabanas del Cubiyú.
- Pitylus grossus grossus* (Linneo)
Meta: río Guapaya y Caño Yerlí (3).
Vaupés: Mitú (30).
- Pitylus grossus saturatus* Todd
Chocó: río Jurubidá, río Tanela (19).
Santander: El Centro (4).
Cauca: Guapi (26).
- Paroaria gularis gularis* (Linneo)
Meta: río Guayabero (28).
Caquetá: La Vega (Florencia).
Amazonas: Puerto Nariño.
- Paroaria gularis gularis nigro-genis*
Vaupés: Mitú (30).
- Paroaria gularis* subsp
Cundinamarca: Bogotá (31d).
- “El ejemplar del presente registro fue capturado en un árbol del jardín de una casa particular en el sector norte de la ciudad; en el mismo árbol y en fecha diferente se observaron dos individuos más. Sin duda se trata de una migración de la región cisandina colombiana a la Sabana de Bogotá”. Cf. *Olivares* (31d).
- Pyrruloxia phoenicea* (Bonaparte)
Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).
- Pheucticus aureoventris uropygialis*
Sclater y Salvin
Norte de Santander: Cácuta, Chitagá.
Boyacá: Soatá (7).
Cund.: San Miguel (31d), Usaquén (31d), Sibaté (31d), Tunjuelo (31d), Cota (31d), Chocontá (31d), Guasca (31d), Ubaté (31d), Chía (31d), Torca (31d), Suba (31d), Cogua (31d), Une (31d).
- Pheucticus ludovicianus* (Linneo)
Guajira: Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).
Bolívar: Cansona (20a), Arroyo Cacao (20a).
Norte de Santander: Gramalote, El Diamante, Santa Librada (Sarrare), La Donjuana.
Santander: Barichara, San Gil, Simacota.

Boyacá: río Chicamocha (7), Páez (29).

Cundinamarca: Albán (31d), Fusagasugá (31d), Chía (31d), Que-tame (Guayabetal) (31d), Une (31d), Puerto Salgar.

Tolima: Ataco (27).

Meta: Acacias, río Ocoa.

Valle: San Antonio (24a).

El material no citado anteriormente en la literatura fue coleccionado de octubre a febrero 3.

Cyanocompsa cyanooides cyanooides
(Lafresnaye)

Norte de Santander: Petrólea, río Tibú.

Chocó: río Tulapa (19), río Tanela (19).

Santander: El Centro (4), San Vicente.

Cauca: El Tambo (río Munchique), Guapi (26).

Cyanocompsa cyanooides rothschildii
(Bartlett)

Norte de Santander: Catatumbo.

Meta: Macarena, Caño Yerlí (3), río Guayabero.

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Vaupés: Mitú (31), selvas aledañas a los caños Cubiyú y río Negro (31).

Passerina cyanea (Linneo)

Magdalena: El Difícil (8, 17).

Chocó: Sautatá (cerca a la boca del río Atrato) (8, 17).

Tiaris olivacea dissita

Thayer y Bangs

Norte de Santander: La Donjuana, Cúcuta.

Santander: Simacota.

Antioquia: Rionegro.

Cundinamarca: El Colegio (31d),

Santandercito (31d), La Vega

(31d), Laguna de Pedropalo, El

Peñón, Fusagasugá.

Valle: San Antonio (24a).

Caquetá: Florencia.

Tiaris bicolor omissa Jardine

Guajira: Mayapo, Serranía de Macuira (Internado de Guajira) (21a).

Santander: Pescadero, Bucaramanga, Barichara, Socorro.

Boyacá: Soatá (7).

Cund.: Fusagasugá: (31d), Girardot (31d), La Vega (31d), Rafael Reyes.

Tiaris bicolor huilae Miller

Tolima: Guamo, Espinal, Ibagué.

Spiza americana (Gmelin)

Guajira: Serranía de Macuira (Internado de Guajira) (21a).

Antioquia: Medellín.

Norte de Santander: San Luis (Cúcuta).

Boyacá: Soatá (7), Miraflores (29).

Meta: Los Micos (3), río Meta.

Tolima: Armero.

Nariño: Buesaco.

El ejemplar de Norte de Santander es de marzo 5. Se ha discutido si esta especie es *Icteridae* o *Fringillidae*; últimamente Blake y de Schauensee la reconocen como *Fringillidae*.

Sporophila schistacea incerta Riley
Cauca: Guapi (26).

Sporophila intermedia intermedia
Cabanis
Magdalena: Isla de Salamanca.
Norte de Santander: Cúcuta, Petrólea, Tibú, río Presidente, Catatumbo.
Meta: Apiay, Restrepo, Cumaral, Guamal.
Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Sporophila intermedia bogotensis
(Gilliard)
Santander: El Centro (4).
Risaralda: Pereira.
Valle: Cali (6a).

Sporophila intermedia agustini x *bogotensis*
Cund.: Puerto Salgar (31d), La Vega (31d), Sasaima (31d), Santandercito (31d), Fusagasugá (31d), Rafael Reyes, El Peñón, Laguna de Pedropalo.
Tolima: Ibagué, Espinal.

Sporophila plumbea whiteleyana
(Sharpe)
Meta: Los Micos (3), río Guayabero (28), Remolino.

Sporophila plumbea colombiana
(Sharpe)
Tolima: Melgar.

Sporophila obscura obscura
(Lafresnaye y d'Orbigny)
Santander: región de Barranca-bermeja, San Vicente, Simacota.

Boyacá: Soatá (7).
Cund.: El Hospicio, Santandercito (31d), Aguadita (31d), El Peñón, Rafael Reyes, Laguna de Pedropalo.
Tolima: Guamo.

El ejemplar de Soatá (hembra) fue examinado por J. T. Zimmer quien conceptuó: "(This is *Sporophila obscura* and seems to be most like the typical *obscura obscura*, being duller in color than *hapalochroma*"). Borrero y Olivares (7), hacen comentarios al respecto.

Sporophila americana murallae
Chapman
Boyacá: Soatá (7).
Caquetá: Villa Fátima.
Putumayo: Puerto Asís (31a).
Amazonas: Leticia, Puerto Nariño, Isla Ronda (río Amazonas).

Sporophila americana chocoana
(de Schauensee)
Antioquia: río Guadualito (19).
Valle: río Raposo.

Sporophila americana ophthalmica
(Sclater)
Cauca: Guapi (26).

Sporophila luctuosa (Lafresnaye)
Norte de Santander: Pamplona (24b), Gramalote.
Santander: El Centro (4).
Boyacá: Miraflores.
Cundinamarca: Suba (31d), Sibaté (31d), Sabana de Bogotá (31d), Arbeláez (31d), La Vega (31d), Chía (31d), San Miguel

(31d), Une (31d), El Peñón.

Tolima: Espinal.

Meta: Villavicencio, Quetame, Acacías, río Guayabero (28), Guamal.

Caquetá: Villa María (río Ortegaza).

Sporophila nigricollis nigricollis
(Vieillot)

Bolívar: San Carlos (20a), San Isidro (20a).

Norte de Santander: Pamplona (24b), Gramalote, Lourdes, Cúcuta, río Zulia, Chinácota, Cataumbo.

Santander: Socorro, El Centro (4), región del Carare (Vélez), San Vicente.

Cund.: Santandercito (31d), El Colegio (31d), Sasaima (31d), La Vega (31d), Une (31d), Fusagasugá (31d), Villeta, Mosquera, La Mesa, Rafael Reyes, Madrid, Laguna de Pedropalo, El Peñón, San Antonio de Tena.

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Tolima: Carmen de Apicalá.

Meta: Villavicencio, Acacías, Guamal, San Juan de Arama.

Huila: Villavieja (23).

Nariño: La Unión.

Caquetá: Tres Esquinas.

Sporophila lineola subsp

Vaupés: Mitú (31), Caño Cuduyarí (31).

Sporophila castaneiventris Cabanis

Meta: Puerto López.

Nariño: río San Miguel (16).

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Vaupés: Santa Cruz de Waracapurí (25), Mitú (32).

Caquetá: Florencia, río Ortegaza (Villa Fátima), Villa María, La Providencia.

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Leticia, Puerto Nariño.

Sporophila minuta minuta (Linneo)

Magdalena: Isla de Salamanca.

Bolívar: San Carlos (20a), Yatí (20a).

Norte de Santander: Chinácota, Gramalote, Cataumbo, Tibú.

Antioquia: Casabe, Sonsón (31b).

Chocó: Sautatá (19), Acandí (19).

Santander: El Centro (4), Carare (Vélez), El Guadual.

Boyacá: Soatá (7).

Cundinamarca: Utica (31d), Tocaima (31d), Sasaima (31d), El Colegio (31d), Puerto Salgar (31d), La Vega (31d), Arbeláez, El Peñón, Santandercito, San Antonio de Tena.

Tolima: Melgar, Espinal, Mariquita, Carmen de Apicalá, Guamo (25a).

Meta: Los Micos (3), Laguna de Tanané, San Carlos de Guaroa, Pachiaquiario.

Huila: San Agustín.

Caldas: La Dorada.

Cauca: Mercaderes.

Nariño: río Mayo.

Catamenia analis schistaceifrons
Chapman

Boyacá: Motavita, Tunja.
 Cundinamarca: Cogua (31d), Mosquera (31d), Cerro de Novilleros (31d), Tabio (31d), Gachancipá (31d), El Otoño (31d), Colinas de Terreros (31d), Guatavita, San Antonio de Tena, Laguna de La Herrera.

Catamenia inornata minor

Berlepsch

Boyacá: Motavita (vereda el Salvial), Arcabuco (dos kilómetros al oriente de la población).

Cund.: Cruz Verde (31d), Páramo de Beltrán (31d), Páramo de Guasca (31d), Represa de Usme (31d), Lagunas del Chisacal (31d), Boquerón de Chipaque (31d), Páramo de Sumapaz (31d).

Nariño: El Espino.

Catamenia homochroa homochroa

Sclater

Cund.: San Miguel (31d).

Oryzoborus crassirostris crassirostris
 (Gmelin)

Norte de Santander: Zulia.

Vaupés: Mitú (31).

Oryzoborus crassirostris occidentalis
 Sclater

Chocó: Sautatá (19).

Santander: El Centro (4), Jarima.

Cund.: Sasaima (31d), La Vega (31d), Rafael Reyes, El Peñón.

Cauca: río Cauca, Guapi (26), El Tambo (13).

Oryzoborus angolensis torridus
 (Scopoli)

Arauca: río Cobaría (La Ceiba) (2).

Boyacá: río Cobugón (La Primavera) (2), Miraflores (29).

Cundinamarca: Quetame.

Meta: río Guayabero (28), Pachaquiario, Cubarral.

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Vichada: Santa Teresita (31c).

Vaupés: Mitú (32), Sabanas del Cubiyú.

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Leticia (31b).

Oryzoborus angolensis funereus
 Sclater

Bolívar: Tierra Alta (20a).

Ant.: entre Zaragoza y Anorí.

Santander: Albania, San Vicente, El Guadual, Carare (Vélez).

Cund.: Puerto Salgar (31d), La Vega (31d), Rafael Reyes, El Peñón.

Oryzoborus angolensis subsp
 Santander: El Centro (4).

Volatinia jacarina splendens
 (Vieillot)

Magdalena: Isla de Salamanca.

Norte de Santander: El Diamante, Tibú.

Antioquia: Sonsón (31b).

Chocó: Titumate (19).

Santander: San Gil, El Centro (4), Simacota, Carare (Vélez), San Vicente.

Boyacá: Soatá (7), Miraflores (29), Pore.

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Cund.: Fusagasugá (31d), El Colegio (31d), Puerto Salgar (31d), Girardot (31d), Utica (31d), Viotá (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Chochí (31d), Rafael Reyes, El Peñón, Anapoima.

Caldas: La Victoria.

Tolima: Melgar, Cabrera, Carmen de Apicalá, Guamo (25a), Mariquita.

Meta: Los Micos (3), río Guayabero (28), Cubarral, Laguna de Tanané.

Cauca: Guapi (26).

Vaupés: Mitú (25).

Spinus spinescens spinescens

(Bonaparte)

Norte de Santander: Pamplona (24b).

Antioquia: Jericó.

Boyacá: Tunja, Ventaquemada, Motavita, Sutatenza.

Cund.: Santandercito (31d), Boyacá (31d), Usme (31d), San Miguel (31d), Páramo de Guasca (31d), Usaquén (31d), Sopó (31d), Tabio (31d), La Vega (31d), Ubaté (31d), La Herrera (31d), La Mesa (31d), Gachancipá (31d), Laguna de Suesca (31d), Zipaquirá (31d), Laguna del Chisacal, Guatavita, Une (31d), Mosquera, Madrid, Laguna de Pedropalo.

El ejemplar de Santandercito es el de la localidad más baja hasta el presente anotada (1.500 m).

Spinus cucullatus (Swainson)

Norte de Santander: La Donjuana.

Spinus magellanicus subsp

Boyacá: Motavita.

El presente registro es sobre un macho adulto y de plumaje fresco; tiene el par central de rectrices completamente negro, lo cual difiere de las descripciones que dicen ser la cola negra con la base amarilla; pudiera tratarse de una subespecie no descrita en Boyacá. Se conocía la especie en Colombia tan solo de Nariño y Caldas.

Spinus xanthogaster xanthogaster

(Du Bus)

Norte de Santander: La Donjuana, Santa Librada (Sarare).

Antioquia: Caldas.

Cundinamarca: Sasaima (31d).

Caldas: Chinchiná (5).

Spinus psaltria colombianus

(Lafresnaye)

Norte de Santander: Chinácota, Pamplona (24b), Gramalote.

Antioquia: Sabaneta.

Boyacá: Miraflores (29), Soatá.

Cund.: Santandercito (31d), Fusagasugá (31d), Ubaté (31d), Chocontá (31d), Sasaima (31d), Usaquén (31d), Zipaquirá (31d), Guasca (31d), Boquerón de Chipaque (31d), Une (31d), Ubaque (31d), La Vega (31d), Carupa (31d), San Antonio de Tena, El Peñón, Laguna de Pedropalo, Madrid, Laguna de La Herrera, Rafael Reyes.

Tolima: Carmen de Apicalá, Gualanday, Ataco (27).

Meta: Acacías.

Valle: Cali (6a).

Huila: Garzón.

Sicalis flaveola flaveola (Linneo)

Guajira: Mayapo, Serranía de Macuira (Internado Guajira) (21a).

Magdalena: Isla de Salamanca.

Bolívar: Magangué, Yatí (20a).

Cartagena (Isla del Rosario).

Norte de Santander: Cúcuta, Santiago.

Cundinamarca: Bogotá (31d).

Meta: Apiay, río Ocoa, Los Micos (3).

Huila: Neiva.

Sicalis luteola luteola (Sparman)

Tolima: Guamo.

Sicalis luteola bogotensis Chapman

Norte de Santander: región de Mústisca.

Boyacá: Tunja.

Cund.: Chocontá (31d), Suesca (31d), Represa del Sisga (31d),

San Miguel (31d), Cota (31d),

Páramo de Guasca (31d), Usa-

quén (31d), Mosquera (31d),

Suba (31d), Funza (31d), Ma-

drid, El Prado (31d), Zipaquirá

(31d), Represa del Neusa (31d),

Laguna de La Herrera.

Phrygilus unicolor geospizopsis

(Bonaparte)

Boyacá: Motavita (vereda El Salvial, Páramo San Juan).

Cundinamarca: Páramo del Verjón (31d), Páramo de La Rusia

(31d), Alto de la Viga (31d), Páramo de Chipaque (31d), Páramo de Palacio (31d), Lagunas del Chisacal (31d), Páramo de Sumapaz (31d).

Caldas: Alrededores del Nevado del Ruiz.

Se ha discutido sobre tamaño de los individuos en las poblaciones de nuestros páramos de uno y otro rama de los Andes: la dimensión del ala para los machos va de 83 a 100 mm.; para las hembras de 78 a 92. Los machos (4) del Nevado del Ruiz tienen un ala de 88 a 91; las hembras (4) de la misma localidad de 84 a 86; el macho de Motavita que está en el plumaje del joven (similar al de la hembra), ala, 82. En los machos aquí estudiados la cola marca de 63 a 64; la de las hembras, de 61 a 64. El ala del material del Nevado del Ruiz (Andes Centrales) no difiere de las de los ejemplares de los Andes Orientales. En cuanto a pico el material del Nevado del Ruiz lo tiene de 12 mm. de longitud; material de varios páramos de los Andes Orientales lo tienen de 11 y es menos robusto.

Chapman en su descripción de la subespecie *grandis* de los Andes Centrales dice que se distingue por su mayor tamaño, pero por la anterior comparación solo tiende a ser separable por el tamaño del pico. En cuanto a coloración las características de *grandis* no se ven claras en el material del Nevado del Ruiz al compararlo con una buena serie de ejemplar-

res de los Andes Orientales. En los especímenes de una y otra población hay gran variedad de matices que hace imposible ver en el material de los Andes Centrales las características cromáticas en machos y hembras alegadas para *grandis*, de ahí que se identifique como *goespizopsis* la serie aquí tratada del Nevado del Ruiz, en lo cual se sigue a de Schauensee quien anota a dicha subespecie material de los Andes Central y Orientales en su última publicación (1964).

En los alrededores del Nevado del Ruiz es bastante frecuente a los 4.100 m. y aún se vieron individuos junto a la línea de nieve. En Motavita se observaron muy pocos individuos.

Haplospiza rustica rustica
(Tschudi)

Cund.: San Miguel (31d), La Aguadita (31d).

Coryphospingus pileatus brevicaudus
Cory

Guajira: Mayapo, Calonka (20), Serranía de Macuira (21a).

Coryphospingus pileatus rostratus
Miller

Boyacá: región de Muzo.
Cund.: Fusagasugá (31d), Girardot (31d).
Tolima: Melgar, Cabrera.

Los especímenes de Fusagasugá tienden a ser más oscuros que los de Girardot y Melgar, estas últimas

localidades son unos 1.000 m. más bajas que Fusagasugá.

Atlapetes gutturalis gutturalis
(Lafresnaye)

Cund.: La Aguadita (31d), Chichipay (31d), La Vega (31d), Laguna de Pedropalo.

Atlapetes pallidinucha pallidinucha
(Boissonneau)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Chitagá, Mutiscua.

Boyacá: Motavita, Soatá (7), Alto de Onzaga (7).

Cund.: La Calera (31d), Usaquén (31d), Aguabonita (31d), Aguadita (31d), Bojacá (31d), San Miguel (31d), Represa del Siga (31d), Anolaima, Sopó (31d), El Verjón (31d), Mosquera, La Mesa, Ubaté (31d), El Chicó (31d), Boquerón de San Cristóbal (31d), Suba (31d).

Atlapetes pallidinucha papallactae
Hellmayr

Cauca: Paletará.

Atlapetes rufinucha simplex
(Berlepsch)

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Chiquinquirá (1), Lago de Fúquene (1), Arcabuco.

Atlapetes rufinucha cauae
Chapman

Cauca: San Antonio.

Atlapetes rufinucha nigrifrons
Phelps y Gilliard

Madalena: Sierra de Perijá (Hi-

roca) (12a, 17'), Africa (12a, 17), Monte Elías (12a, 17).

Atlapetes albofrenatus albofrenatus
(Boissonneau)

Santander: Onzaga.

Boyacá: Alto de Onzaga (7), Región de Muzo, Arcabuco.

Cund.: Albán (31d), Aguabonita (31d), Laguna de Pedropalo, La Vega.

Atlapetes schistaceus schistaceus
(Boissonneau)

Antioquia: San Pedro, Páramo Frontino.

Cund.: Sabana de Bogotá, Usaquén (31d), Aguadita (31d), San Miguel (31d), La Herrera, La Mesa (31d), La Cita (31d), Represa del Sisga (31d), El Chicó (31d), Boquerón de Chipaque (31d), Páramo de Zipaquirá (31d), Páramo de Guasca (31d).

Tolima: Herveo.

Tan solo se conocía de "Bogotá" por pieles de negocio que podían ser de cualquier parte de Colombia; ahora con estos registros está aclarado lo de la presencia de la especie en la Sabana de Bogotá, donde es frecuente.

Atlapetes schistaceus tamae

Cory

Norte de Santander: región de Chitagá, Mutiscua.

Santander: Piedecuesta.

Boyacá: La Primavera (2).

Atlapetes schistaceus fumidus

Wetmore y Phelps

Magdalena: Sierra de Perijá (Laguna de Juncos) (12a, 17), Cerro Pintado (12a, 17).

Atlapetes tricolor (Taczanowski)

Valle: río Anchicayá (carretera Buenaventura - Cali) (24).

Atlapetes tricolor subsp

Nariño: Ricaurte (35).

Atlapetes semirufus semirufus

(Boissonneau)

Cund.: Chipaque, Une (31d).

Atlapetes semirufus zimmeri

de Schauensee

Norte de Santander: La Donjuana.

Boyacá: Páez (29), Valle del Cusiana.

Atlapetes semirufus zimmeri x *semirufus*

Boyacá: Pajarito (Alto río Cusiana) (31e).

Atlapetes brinneinucha frontalis

(Tschudi)

Norte de Santander: Pamplona (24b), Toledo.

Boyacá: Páez (29), Páramo de Vijagual.

Cund.: Albán (31d), La Aguadita (31d), Aguabonita (31d), Páramo de Guasca (31d), Boquerón de Chipaque (31d), Cáqueza (31d), Fusagasugá (31d), El Colegio (31d), Mchetá (31d), Gachetá (31d), Santandercito (31d), Choachí (31d), Une (31d), Laguna de Pedropalo.

Meta: Pico Renjifo (3).

Nariño: Cerro Pax (16).

Atlapetes torquatus assimilis

(Boissonneau)

Ant.: entre Zaragoza y Anorí.

Boyacá: Montañas de Leiva.

Cund.: Subachoque (31d), San Miguel (31d), Represa del Sisga (31d), Torca (31d), El Chicó (31d), Boquerón de Chipaque (31d), Fómeque (31d), Aguabonita (31d), Facatativá (31d), Usaquén (31d).

Atlapetes torquatus perijanus

Phelps y Gilliard

Magdalena: Sierra de Perijá (Tierra Nueva) (12a, 17), Monte Elías (12a, 17).

Norte de Santander: La Donjuana, Pamplona (24b).

Atlapetes atricapillus atricapillus

(Lawrence)

Santander: Mogotes.

Cund.: El Colegio (31d), Sasaima (31d), La Vega (31d).

Oreothraupis arremonops (Sclater)

Antioquia: Frontino (14, 1).

Cauca: Cerro Munchique (14, 1).

Arremon taciturnus taciturnus

(Hermann)

Guainía: Obando (Puerto Inírida) (31c).

Arremon taciturnus axillaris

Sclater

Boyacá: Miraflores (29).

Meta: La Macarena, Los Micos,

Acacías, Buenavista, San Martín, Los Micos (3), río Guapaya (3), río Guayabero (28).

Arremon schlegeli schlegeli

Bonaparte

Bolívar: Cansona (20a), San Jacinto (20a).

Arremon schlegeli canidorsum

Zimmer

Boyacá: río Chicamocha (7).

Arremon aurantiirostris erythrorhynchus Sclater

Ant.: entre Zaragoza y Anorí.

Santander: Vereda Llanafría, San Vicente.

Cund.: Utica (31d), Anapoima (31b, 31d), Puerto Salgar.

Tolima: Gualanday, Guamo, Espinal, Mariquita (13).

Cauca: El Tambor (Santander) (13).

Arremon aurantiirostris occidentalis

Hellmayr

Valle: río Raposo.

Cauca: Guapi (26).

Arremon aurantiirostris spectabilis

Sclater

Nariño: San Miguel (16), río Churuyacu (16).

Arremonops conirostris conirostris

(Bonaparte)

Bolívar: Arroyo Camaroncito (20a).

Santander: El Centro (4), El Guadual.

Cund.: Santandercito (31d), Que-

tame (Guayabetal) (31d), Ana-poima (31d), Girardot (31d), Fusa.: 31d), Sasaima (31d), Arbeláez (31d), La Vega (31d), Puerto Salgar, Rafael Reyes, San Antonio de Tena.

Tolima: Carmen de Apicalá, Ataco (27), Guamo (25a), Melgar. Meta: Acacias, Los Micos (3), río Guayabero (28), río Ocoa, Cubarral, Puerto Gaitán.

Vaupés: San José del Guaviare (30).

Antes *Arremon.* Cf. de Schauensee (17a).

Arremonops conirostris umbrinus
(Todd)

Norte de Santander: Astillero, Villa Feliza (S. de Cúcuta), Tibú, río Presidente (Catatumbo), Santa Librada (Sarare).

Arremonops conirostris striaticeps
(Lafresnaye)

Chocó: Sautatá (19).
Cauca: Guapi (26).

Arremonops tocuyensis (Todd)

Guajira: Calonka (20), Serranía de Macuira (Kayúspanau) (21a).

Myospiza humeralis humeralis
(Bosc)

Meta: Laguna de Tanané, San Carlos de Guaroa, Sabana de Surimena, San Martín, Los Micos (3), río Guayabero (28).
Vaupés: Mitú (30), San José del Guaviare.

Myospiza aurifrons aurifrons
(Spix)

Nariño: río San Miguel (16).

Caquetá: Montañitas, Villa María (río Orteguzza), Villa Fátima, La Providencia, Venecia.

Vaupés: Mitú (32).

Putumayo: Puerto Asís (31a).

Amazonas: Leticia.

Myospiza aurifrons apurensis

Phelps y Gilliard

Norte de Santander: río Zulia (Puente Ospina).

Boyacá: río Cobugón (El Porvenir) (2).

Arauca: río Arauca (2), río Bojaba (2).

Meta: río Guayabero (28).

Myospiza aurifrons cherriei

Chapman

Meta: Remolino, Llanos de San Martín, Quetame, Guamal.

Zonotrichia capensis costaricensis

(Allen)

Guajira: Serranía de Macuira (Nazaret) (21a).

Norte de Santander: Gramalote, La Donjuana, Lourdes, Pamplonita.

Santander: Simacota.

Boyacá: Tunja, Motavita, Miraflores (29), Soatá (7), Alto de Onzaga (7).

Cund.: Santandercito (31d), Fugasugá (31d), Aguadita (31d), Aguabonita (31d), Ubaté (31d), Páramo de Guasca (31d), Suba (31d), Usme (31d), Bojacá (31d), Represa del Muña (31d), (31d), Albán (31d), Usaquén (31d), La Vega (31d), El Hospi-

cio (31d), Laguna de Pedropalo (31d), Guatavita (31d), Chía (31d), Mosquera, La Mesa (31d), Gachancipá (31d), Torca (31d), Sopó (31d), Represa del Sisga (31d), Chocontá (31d), La Calera (31d), San Miguel (31d), Páramo de Sumapaz (31d), Cáqueza (31d), Ubaque (31d), Une (31d), San Antonio de Tena, Pacho.

Caldas: Manizales.

Tolima: Melgar (Boquerón), Ataco (27).

Nariño: Buesaco.

Caquetá: Recina.

Zonotrichia capensis roraimae
(Chapman)

Meta: río Guayabero (28).

Vaupés: Sabanas del Cubiyú (31).

Emberizoides herbicola sphenurus
(Vieillot)

Meta: Los Micos (3), río Güejar.

Valle: Cali (6a).

Emberizoides herbicola apurensis

Gilliard

Cundinamarca: Rafael Reyes, Anapoima.

Meta: Quenane (17), Tanané (6), Villavicencio, San Martín, Remolino.

Vaupés: Sabanas del Cubiyú y selvas aledañas (31).

Emberizoides herbicola apurensis
(Gilliard)

Meta: Sabanas de Surimena (11).

REFERENCIAS

- 1 BLAKE, Emmet Reid
1959 "New and Rare Colombian Birds". Lozania (Acta Zoológica Colombiana), 11: 1-10.
- 2 1961 "Notes on a Collection of Birds from Northeastern Colombia". Fieldiana Zoology, 44 (4): 25-44.
- 3 1962 "Birds of the Sierra Macarena, Eastern Colombia". Fieldiana Zoology, 44 (11): 69-112.
- 4 BOGGS, G. O.
1961 "Notas sobre las aves de 'El Centro' en el valle medio del río Magdalena Colombia". Novedades Colombianas, 1 (6): 401-423.
- 5 BORRERO, José Ignacio
1955 "Apuntes sobre aves colombianas". (Nº 2). Lozania (Acta Zoológica Colombiana), 9: 1-15.
- 6 1960 "Notas sobre aves de la Amazonia y Orinoquia Colombianas". Caldasia, 8 (39): 486-514.
- 6a 1968 "Notas ecológicas sobre aves del Valle del Cauca". Bol. Dep. Biol.: U. Valle, 1 (1): 5-11.
- 7 BORRERO, José Ignacio y Antonio OLIVARES, O. F. M.
1955 "Avifauna de la región de Soatá, Departamento de Boyacá, Colombia". Caldasia, 7 (31): 52-86.
- 8 BORRERO, José Ignacio y Jorge HERNANDEZ C.
1957-a "Notas sobre aves de Colombia - Dos nuevas aves para la Avifauna Colombiana". Caldasia, 7 (35): 357-358.
- 9 1957-b "Informe preliminar sobre aves y mamíferos de Santander, Colombia". Anales de la Sociedad de Biología, 7 (5): 197-212.
- 10 1958 "Apuntes sobre aves colombianas". Caldasia, 8 (37): 252-294.
- 11 1961 "Notas sobre aves de Colombia y descripción de una nueva subespecie *Forpus conspicillatus*". Novedades Colombianas, 1 (6): 430-445.
- 12 BORRERO, José Ignacio, Antonio OLIVARES, O. F. M., Jorge HERNANDEZ C.
1962 "Notas sobre aves de Colombia". Caldasia, 8 (40): 585-612.

- 12a CARRIKER, Melbourne Armstrong, Jr.
1954 "Additions to the Avifauna of Colombia". *Novedades Colombianas*, 1: 14-19.
- 13 1955 "Notes on the Occurrence and Distribution of Certain Species of Colombian Birds". *Novedades Colombianas*, 2: 48-64.
- 14 1959 "New Records of Rare Birds from Narifio and Cauca and Notes on Other". *Novedades Colombianas*, 1 (4): 196-199.
- 15 DE SCHAUENSEE, Rodolphe Meyer
1950 "Colombian Zoological Survey. Part VII. A Collection of Birds from Bolívar, Colombia". *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 102: 111-139.
- 16 1952 "Colombian Zoological Survey, Part X. A Collection of Birds from Southeastern Narifio, Colombia". *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 104: 1-33.
- 17 1959 "Additions to the 'Birds of the Republic of Colombia'". *Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.*, 111: 53-75.
- 17a 1964 "The Birds of Colombia". *Acad. Nat. Sci. Phila.*, pp. 1-x, 1-427. Narberth, Pennsylvania.
- 17b 1966 "The Species of Birds of South America with their Distribution". *Id.*, pp. i-xvii, 1-578. Narberth, Pennsylvania. Con doble Addenda y corrigenda.
- 18 DUGAND, Armando
1952 "Algunas aves del río Apaporis". *Lozania* 4, pp. 1-12.
- 19 HAFFER, Jürgen
1959 "Notas sobre las aves de la región de Urabá". *Lozania*, 12: 1-49.
- 20 1961 "Notas sobre la avifauna de la Península de la Guajira". *Novedades Colombianas*, 1 (6): 374-395.
- 20a HAFFER, Jürgen y José Ignacio BARRERO
1965 "On Birds from Northern Colombia". *Rev. Biol. Trop. Univ. de Costa Rica*, 13 (1): 29-53.
- 21 LEHMANN, Federico Carlos
1957 "Contribuciones al estudio de la Fauna de Colombia, XII". *Novedades Colombianas*, 3: 101-155.
- 21a MARINKELLE, Cornelis J.
1970 "Birds of the Serranía de Macuira, Guajira Peninsula, Colombia". *Mitt. Inst. Colombo-Alemán Invest. Cient.*, 4: 15-34.
- 22 MILLER, Alden H.
1947 "The Tropical Avifauna of the Upper Magdalena Valley, Colombia". *The Auk*, 64: 351-381.
- 23 1952 "Supplementary data on the tropical Avifauna of the Arid Upper Magdalena Valley of Colombia". *The Auk*, 69: 450-457.
- 24 1960 "Additional Data on the Distribution of Some Colombian Birds". *Novedades Colombianas*, 1 (5): 235-238.
- 24a 1963 "Seasonal Activity and Ecology of the Avifauna of an American Equatorial Cloud Forest". *Univ. of California Publ. in Zool.*, 66 (1): 1-78.
- 24b NICEFORO, María, Hermano
1967 "Forma parcial y algunos fósiles de la región de Pamplona". *El Aguilucho - Colegio Provincial, Pamplona, Norte de Santander, Colombia*, 44: 1-12.
- 25 OLIVARES, Antonio, O. F. M.
1955 "Algunas aves de la Comisaría del Vaupés (Colombia)". *Caldasia*, 7 (33): 259-275.
- 25a 1957 "Algunas aves del Valle del Alto Magdalena, Colombia". *Rev. Acad. Coomb. Cienc.* 10 (39): 115-121.
- 26 1958 "Aves de la Costa del Pacífico, municipio de Guapí, Cauca, Colombia, III". *Caldasia*, 8 (37): 217-251.
- 27 1960 "Algunas aves de Gaitania (Municipio de Ataco, Tolima, Colombia)". *Caldasia*, 8 (38): 379-382.
- 28 1962 "Aves de la Región Sur de la Sierra de La Macarena, Meta, Colombia". *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 11 (44): 305-345.
- 29 1963 "Notas sobre aves de los Andes Orientales en Boyacá". *Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales*, 25 (106): 91-125.
- 30 1964-a "Adiciones a las aves de la Comisaría del Vaupés (Colombia), I". *Rev. Acad. Colomb. Cien.*, 12 (46): 163-173.
- 31a 1966 "Algunas aves de Puerto Asís, Comisaría del Putumayo, Colombia". *Id.*, 9 (44): 379-393.
- 31b 1967 "Avifaunae Colombiensis, Notulae —II— Seis Nuevas Aves para Colombia y Apuntamientos sobre sesenta especies y subespecies registradas anteriormente". *Id.*, 10 (46): 39-58.
- 31c 1969-a "Aves de la Comisaría del Vichada y Guainía, Colombia, coleccionadas por el Dr. C. J. MARINKELLE". *Bol. Soc. Ven. Cienc Nat.*, 28 (115-116): 179-200.

- 31d 1969-b "Aves de Cundinamarca". Universidad Nacional de Colombia, Dirección de Divulgación Cultural, pp. 1-xxxxvi, 1-425, figs. 3, lams. 41, map. 2.
- 31e 1971 "Aves de la ladera oriental de los Andes Orientales, Alto río Cusiana, Boyacá, Colombia". *Caldasia*, 11 (51): 203-226.
- 32 OLIVARES, Antonio, O. F. M. y Jorge HERNANDEZ C.
1962 "Aves de la Comisaría del Vaupés (Colombia)". *Revista de Biología Tropical, Universidad de Costa Rica*, 10 (1): 61-90.
- 33 PARKES, Kenneth C.
1959 "A new race of *Saltator albicollis* from Venezuela and Adjacent Colombia". *Novedades Colombianas*, 1 (4): 200-201.
- 34 VON SNEIDERN, Kjell
1954 "Notas sobre algunas aves del Museo de Historia de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia". *Novedades Colombianas*, 1: 3-11.
- 35 1955 "Notas ornitológicas sobre la colección del Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca". *Novedades Colombianas*, 2: 35-44.
- 36 WETMORE, Alexander
1955 "Further Additions to the Avifauna of Colombia". *Novedades Colombianas*, 2: 45-47.



NEGOCIOS EN NUEVA YORK Y EL RESTO DEL MUNDO ?

usted necesita un solo banco

BANCO DE BOGOTÁ
**EL BANCO
COMPLETO**



Ya no es necesario hacer conexiones con una serie de Bancos en el complejo mundo financiero internacional. Ahora el Banco de Bogotá es el banco que en Colombia puede hacerlo todo. El Banco de Bogotá es el único banco latinoamericano autorizado para operar como banco independiente en la capital financiera del mundo: Nueva York. Tiene sucursales propias en Quito y Panamá, y corresponsales en todo el mundo... Es el Banco Completo que durante más años ha servido a los colombianos.

**con más servicios para los colombianos
dentro y fuera del país.**